

1896

Experimentelle Untersuchungen niger in ihrer Wirkung noch unbekannter **Digitalisspecies.**

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doctors der Medicin

verfasst und mit Bewilligung

Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserlichen Universität
zu Dorpat

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

Hesekiel Goldberg

aus Podolien.

Ordentliche Opponenten:

Dr. G. v. Knorre. — Prof. Dr. D. Barfurth. — Prof. Dr. R. Kobert.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.
1892.

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.

Referent: Professor Dr. R. Kobert.

Dorpat, den 13. Mai 1892.

Nr. 349.

Decan: Dragendorff.

Meinen Eltern.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Ich ergreife mit Freuden an dieser Stelle die Gelegenheit, allen meinen hochverehrten Lehrern an der Alma Mater Dorpatensis für die mir zu Theil gewordene akademische Ausbildung meinen tiefempfundenen Dank auszusprechen.

Insbesondere gilt derselbe Herrn Professor Dr. R. K o b e r t für das Thema und Material, sowie für die vielfache Unterstützung bei der Abfassung vorliegender Schrift.

Motto:

Scire potestates herbarum . . .

Aeneis XII. 396.

A. Historisches.

Es ist zu bewundern, wie wenig weit die sicher begründete Geschichte der *Digitalis* zurückreicht. Diese überaus schöne, in Griechenland und Italien heimische Pflanze mit ihren prachtvollen grossen Blüthen soll dem Alterthum, das für pflanzliche Arzneimittel eine so ausgesprochene Vorliebe besass und selbst vor heroisch wirkenden keine Scheu hatte, entgangen sein! Wenigstens findet sich über diese Pflanze in der Geschichte der Jahrhunderte vor wie nach Beginn unserer Zeitrechnung bis in das 12. Jahrhundert hinein überhaupt keine sichere Angabe. Nur auf schwache Versuche einzelner Autoren, sie mit gewissen Pflanzen der Alten zu identificiren stossen wir. So deutet z. B. Caesalpin auf *Digitalis lutea* den in Gräben und stehenden Wassern häufigen Froschlöffel, *Alisma Plantago* ¹⁾, das ἄλισμα, *alisma* (ἀλζέαν, δαμασσώνιον, *damasonium*, ἄκνον, λέρον) des Dioscorides (III, 159) und Plinius (XXV, 87), während Matthiolus darin *Arnica montana*, Fabius Columna *Primula Palinuri* *Petagnae* etc. finden wollen. Die Wurzel dieser Pflanze wurde bei wüthenden Hundebissen, bei Bauchgrimmen und Dysenterie, bei hysterischen Krämpfen, das Kraut bei stockendem Monatsfluss, äusserlich bei wässrigen Geschwülsten in Gebrauch gezogen. — Bei den Hippokratikern war eins der weitaus am häufigsten angewandten Brechmittel eine Pflanze ἐλλέβορος λευκός, eine Pflanze, welche Sibthorp ²⁾

1) Strumpf, F. L., Systematisches Handb. d. Arzneimittellehre Bd. II. 1855. p. 447.

2) Kobert, R., Historische Studien, I. 1889. p. 97.

für *Digitalis ferruginea* L. erklärt hat. Für diese Annahme von Sibthorp spricht aber nur noch eine Angabe von Joh. Peter Frank (de curandis hominum morbis, epitome) wonach auch von Plinius dieses Mittel zur Behandlung Wessensüchtiger sehr empfohlen worden sei. Alle andern Autoren denken gar nicht an *Digitalis*. — Plinius (XXI, 15) endlich spricht in der Aufzählung von schönen Blumen von einer Pflanze *Calathiana* welche C. Bauhin¹⁾ als *Digitalis lutea* gedeutet hat. Alle diese Deutungsversuche gehören früheren Jahrhunderten an; in den letzten Decennien ist man stillschweigend dahin übereingekommen, dass das Alterthum die *Digitalis* in keiner einzigen Species gekannt hat.

In den Ländern des classischen Alterthums also scheinbar unbekannt, ist *Digitalis* vermuthlich zuerst in nordischen Ländern medicinisch benutzt worden²⁾. Das wie es scheint angelsächsische Wort *Fox-glove* = Fuchshandschuh für *Digitalis* lässt sich nach Pereira³⁾ bis in das XI. Jahrhundert zurück verfolgen. Die Pflanze ist häufig zur Bereitung äusserlicher Heilmittel vorgeschrieben, welche in dem aus dem XIII. Jahrhundert stammenden Arzneibuche von Wales «*The Physicians of Myddfay*»⁴⁾ empfohlen werden. Leonhard Fuchs gab der Pflanze den Namen *Campanula silvestris* sei *Digitalis purpurea* von *digitale* = Fingerhut (*digitus* Finger) nach der Form der Krone und bildete sie gut ab; er hob hervor, dass bisher ein lateinischer oder griechischer Name

1) Kobert, R., ebendas. 188.

2) Flückiger, F. A., Pharmakognosie des Pflanzenreiches 3. Aufl. 189.

3) Elements of Mat. med. II, Part. I (1855) 525.

4) Meddygon Myddfay, die Aerzte von Myddfay. Titel eines Arzneibuches aus Wales, welches bis in das XIII. Jahrhundert zurückreicht; es ist von Pughe 1861 in Llandovery mit englischer Uebersetzung herausgegeben worden. Vergl. Flückiger und Hanbury, Pharmakographia. 1879. 76.

5) De Hist. stirpium. Basil. 1542. 892.

für sie gefehlt habe. Die Wirkung der Pflanze soll er aber nicht gekannt haben. Dagegen versichert Cloëtta¹⁾, dass der Fingerhut in Deutschland zum ersten Male als Arzneimittel bereits im Jahre 1542 erkannt wurde. Auch Tragus²⁾ und Anguillara³⁾ nannten die Pflanze *Digitalis purpurea*. Sie wurde um 1550 ohne Zweifel als Zierpflanze in Ferrara⁴⁾ cultivirt.

Ihre giftigen Wirkungen waren damals nicht unbekannt; aber auch die therapeutischen wurden bald, wenn auch zunächst unrichtig, verwendet. So empfahl Parkinson die *Digitalis* in seinem «Theatrum botanicum» innerlich, und 1650 fand sie Aufnahme in die Londoner Pharmakopoë. Um das Jahr 1721 war *Digitalis purpurea* ausser in der Londoner Pharmakopoë (hier wohl ohne rechte Indication) auch noch in einigen anderen gleichzeitigen Pharmakopoën enthalten. Der ältere C. Darwin⁵⁾, der Sohn von Erasmus Darwin, hat 1780 die diuretische Wirkung der *Digitalis purp.* entdeckt, aber erst William Withering⁶⁾, Arzt und Botaniker in Birmingham, hat diese wichtige Entdeckung genauer untersucht und ausführlich beschrieben. Letzterer machte sich auch um die Verbreitung der *Digitalis* in der ärztlichen Praxis von 1775 an verdient. Seit dieser Zeit ist bereits mehr als ein Jahrhundert

1) Cloëtta, Lehrb. d. Arzneimittel- u. Arzneiverordnungslehre, hsgbn von Filehne, VI. Aufl. 1889.

2) De Stirpium . . . nomenclaturis. 1552.

3) Semplici, Vinegia 1561. 222. Merkwürdiger Weise nennt Anguillara Chur als Standort der Pflanze, welche sich heute wenigstens dort nicht befindet.

4) Archiv (der Pharmacie d. Nord-deutsch. Apotheker-Vereins etc.) 225 (1887) 682. Citirt nach Flückiger a. a. O. p. 675.

5) Merat et De Lens, Dictionnaire universel, Tome II (Bruxelles, 1837), p. 133.

6) William Withering, An Account of the Fox-glove. Birmingham and London 1785. 8°. Auch deutsch: «Abhandlung vom rothen Fingerhut und dessen Anwendung in der pract. Heilkunde» von Michaelis, Leipzig 1786. 234 pp. mit (schlechter!) Abbildung.

verflossen und doch hat dieses Mittel nicht aufgehört in der Medicin Gegenstand des lebhaftesten Interesses für Theoretiker und Practiker zu sein.

Wegen der störenden «Nebenwirkungen» versuchte man die Digitalis später durch ähnlich wirkende Mittel, die als Pflanzen übrigens z. Th. schon längst dem Volke bekannt waren, zu ersetzen, und jetzt bilden diese digitalisähnlich wirkenden Pflanzen bereits eine ansehnliche Gruppe. An Wirksamkeit aber übertrifft die Digitalis alle ihre Ersatzmittel. So sprach sich vor wenigen Jahren der bekannte Kliniker H. Eichhorst in der cantonalen Aerzteversammlung zu Zürich in einem längeren Vortrag über «moderne Herzmittel» ¹⁾ folgendermaassen aus: «Trotzdem die neuere Zeit den Arzneischatz mit einer Reihe von Herzmitteln bereichert, verdient die Digitalis noch immer den ersten Platz, wenn die Kraft des Herzens gesteigert, seine Thätigkeit geregelt werden soll.» Andererseits schickte Oswald Schmiedeberg seine bahnbrechende Abhandlung über die Bestandtheile der D. pp. L. ²⁾ in die Welt mit den Schlussworten: «Was die Verwerthung der mitgetheilten Thatsachen in practischer Richtung betrifft, so lässt sich auf Grund derselben für die Anwendung der reinen Digitalisbestandtheile am Krankenbett wenigstens vorläufig kaum eine sehr günstige Zukunft voraussetzen.» Es ist nämlich die Reindarstellung der wirksamen Digitalisbestandtheile zu schwierig und zu kostspielig.

Eine der neuesten Arbeiten über Digitalis (vom Jahre 1892) bildet ein längerer Artikel von James Little³⁾, wo derselbe über Digitalis und deren Ersatzmittel sich dahin ausspricht:

1) Schweiz. Correspondenzblatt, Nr. 2 (citirt nach Virchow-Hirsch 1888. Bd. II, p. 163).

2) Schmiedeberg. Untersuchungen über die pharmakolog. wirksamen Bestandtheile der D. pp. L. Arch. f. exp. Pathol. und Pharmacol. Band III, pag. 16 f.

3) James Little, Birmingham Medical. Review. Februar 1892.

ass zwar *Strophanthus* das beste Ersatzmittel sei; er betont aber ausdrücklich, dass von allen Herzmitteln *Digitalis* weitaus das wichtigste ist.

Im Verlaufe einer relativ kurzen Zeit hat sich über die *Digitalis* und deren Ersatzmittel eine ungeheuer grosse Litteratur angehäuft, wie sie nur noch über wenige sonstige Mittel existirt; das Problem eines in jeder Hinsicht practisch brauchbaren Herzmittels ist aber trotzdem bis jetzt noch nicht gelöst.

Es ist in der Entwicklung der *Digitalis*-frage bemerkenswerth, dass man nach den aus entferntesten Gegenden und aufenteuerlichste Weise verschafften Ersatzstoffen griff; man schabte die den Wilden Westafrikas und Malaccas entnommenen vergifteten Pfeile ab, man griff sogar zu Thieren, wie den Schlangen (*Antihydropin*), Kröten (*Phrynin*); aber die vielen Vertreter der überaus grossen in Europa heimischen *Digitalis*-gattung zu untersuchen — das fiel fast Niemandem ein. — Und doch liegt es auf der Hand, dass dies gerade von grösstem Interesse wäre. Es ist doch wohl denkbar, dass aus manchen *Digitalis*-species die wirksamen Bestandtheile viel leichter und in chemisch reinerem, wenn nicht ganz reinem, Zustande darzustellen sind, als es bei *D. pp.* der Fall ist. Ferner ist es doch wohl möglich, dass manche *Digitalis*-species die wirksamen Bestandtheile in viel grösserer Quantität enthalten, als *D. pp.*, dass die wirksamen Bestandtheile von den störenden Mitwirkungen derjenigen der *D. pp.* frei oder freier sind etc. In der That sind bereits einige Versuche in dieser Richtung gemacht worden, die keineswegs geeignet sind, von Versuchen in derselben Richtung fortzufahren, abzuschrecken. So prüfte Kosmann¹⁾ die *Digitalis parviflora* Roth und wies in derselben Homolle's *Digitalin* nach. Eine andere *Digitalis*-species, nämlich *Digitalis ambigua*

1) Rochleder, *Phytochemie*, p. 161. (citirt nach H. Paschke, *Pharmakol. Untersuchungen über D. ambigua* Murr., *Medicin. Jahrb.* 1888, p. 195).

Murr. untersuchte sehr eingehend H. Paschkis¹⁾ Er verfügte über eine grosse Quantität Blätter und stellte aus denselben nach der Schmiedeberg'schen Methode²⁾ die wirksamen Bestandtheile rein dar, die er dann auf ihre pharmakologische Wirkung untersuchte. Er gelangte zwar zu keinen practisch verwertbaren Resultaten, doch giebt er die Erwartungen davon nicht auf, er glaubt auf sein Digitalein ein besonderes Gewicht legen zu können, da es sich einerseits von sehr geringer «Toxicität», andererseits von kräftiger Wirkung auf den Blutdruck erwies, welche Verhältnisse P. durch die vielleicht grösseren Reinheit seines Digitaleins zu erklären geneigt ist. Leider riess es in zwei Versuchen am Menschen in sehr geringen Gaben (0,5 bis 1 mg) heftiges Erbrechen hervor.

Auf Vorschlag von Prof. Kobert unterzog ich der Prüfung eine Anzahl von Digitalisspecies (s. u.), die noch nie untersucht worden zu sein scheinen. Alle von mir untersuchten Pflanzen verdanke ich Prof. Kobert der Freundlichkeit des Prof. Russow, der dem botanischen Garten zum Anbau derselben willfährig zur Verfügung stellte. Alle Pflanzen (ausser D. pp.) wurden unter specieller Aufsicht des Herrn Inspector Bartelsen im Dorpat botanischen Garten auf ein und demselben Boden und unter ganz gleichen sonstigen Bedingungen gezogen, im Jahre 1888—1889 und theils im ersten, theils im zweiten Jahre sorgfältig gesammelt und aufgehoben. Natürlich waren nur geringe Quantitäten von jeder einzelnen Pflanze vorhanden, so dass ich nicht daran denken konnte etwa mit den aus den Pflanzen rein dargestellten wirksamen Bestandtheilen zu experimentiren. Ich muss mich eben nur darauf beschränken die Drogen als solche phys

1) Paschkis, H. Pharmakol. Untersuchungen über D. ambigua Murr., Medic. Jahrb. 1888, p. 195.

2) Schmiedeberg, O. Untersuchungen über die pharmakol. wirksamen Bestandtheile der D. pp. L., Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. Bd. III, p. 16 f.

gisch zu prüfen und wählte daher als Untersuchungsobjecte nur Frösche, denn einen besseren Prüfstein für Herzgifte als Frösche giebt es nicht. Die Wirkung auf das Froschherz bildet den Ausgangspunkt für die neueren Untersuchungen über die Digitalisgruppe. Zu der letzteren kann nach Schmiedeberg die Substanz ohne Weiteres gerechnet werden, die an Fröschen diese Wirkung zunächst ohne andere Erscheinungen hervorruft.¹⁾ Andererseits arbeitete ich aus erwähntem Grunde nur mit Infusen, weil gerade diese in praxi am häufigsten verwandt werden. An Armblütern habe ich nur ein Paar Durchströmungsversuche ausgeführt.

Ausser den Pflanzen untersuchte ich zu meiner Orientirung vorher noch nach manchen Richtungen hin die reinen wirksamen Bestandtheile der *D. pp. L.*, soweit eben dieselben käuflich, dabei für sehr hohen Preis, zu haben sind.

Es liegt hier daher keineswegs eine abschliessende Arbeit vor. Letztere hat nur den Zweck auf die mögliche Bedeutung der untersuchten Pflanzen hinzuweisen.

Bevor ich zu meinen Untersuchungen übergehe, kann ich nicht umhin, wenigstens in ganz kurzen Zügen, der geschichtlichen Entwicklung der einschlägigen Litteratur Erwähnung zu thun. Dabei bevorzuge ich den Stoff nach der chemischen und physiologischen Richtung hin gesondert zu behandeln.

I. Chemischer Theil. *)

Schon relativ früh tritt das Bestreben auf, das wirksame Princip des Fingerhutes zu erforschen.

1) Schmiedeberg, O., Bemerkungen über die Digitalis- und Digitalinwirkung in historischer und therapeutischer Beziehung, Arch. f. exp. Pathol. und Pharmacol. Bd. XVI. p. 166 ff.

*) Die ältere Litteratur ist meist dem Werke Husemann-Hilger, Pflanzenstoffe, 2. Aufl. Bd. II. 1884, entnommen.

Der erste Stoff, den man darin entdeckte, war eine Säure — Anthirrhinsäure nannte dieselbe ihr Entdecker Morrin¹⁾. Dieselbe ist flüchtiger Natur und ähnlich (vielleicht auch identisch) der Valeriansäure. Neuerdings fand dieselbe H. Pascalis²⁾ auch in *Digitalis ambigua* Murr (*ochroleuca* Jacqu.). Morrin³⁾ fand in der *Digitalis* pp. noch eine zweite Säure — Digitalsäure, die sauer reagirende weisse Nadeln von eigenthümlichem Geruch bildet.

Kosmann⁴⁾ fand weiter Digitaleinsäure (zu unterscheiden von Digitaloinsäure Walz), die grüne, sternförmig gruppirte Nadeln bildet, die bei 30° schmelzen, bitter und zugleich scharf schmecken. Nach Homolle⁵⁾ soll dieselbe giftig wirken (Erbrechen und Prostration).

Nativelle⁶⁾ fand 1867 im Fingerhut drei eigenthümliche Stoffe: das wirksame krystallisirbare in H₂O schwer lösliche Digitalin⁷⁾, das ebenfalls wirksame in H₂O lösliche amorphe Digitalein und die unwirksame «*substance cristallisée inerte*» (anders Digitin), die in H₂O sich nur spurweise löst. Die Entdeckung des eigentlich wirksamen Princips der *Digitalis* erregte seiner Zeit ungeheures allgemeines Aufsehen in der medicinischen Welt, und wurde diese Entdeckung mit dem grossen Preis Orfila zu Anfang des Jahres 1872 belohnt.

Aber noch früher, im Jahre 1845 stellte Homolle⁸⁾ aus den *Digitalis*blättern zuerst ein Digitalin dar, das noch jetzt

1) Journ. Pharm. (3) 7. 299.

2) Vgl. a. a. O.

3) a. a. O. Darstellung siehe p. 295.

4) Journ. Chim. méd. 22. 377. 1846.

5) Union méd. 1872.

6) Guesneville's Monit. scient. T. IX. p. 132. 1867 und N. Jahrb. für Pharm. XXVII. 161. — Wiggers und Husemann, Jahresber. Folge. 1867, p. 295 et seq.

7) Bezeichnung von Wiggers (Jahresber. für Pharmakognosie, Pharmacie etc. 1868. 304). Nativelle selbst nennt den hier als Digitalin angeführten Körper — Digitalein und den hier als Digitalein bezeichneten Digitalin.

8) Journ. Pharm. (3). 7. 57.

unter dem Namen «Französisches Digitalin» gebräuchlich ist. Von Homolle selbst und Quevenne¹⁾ wurde es später als «la digitaline» bezeichnet. Es ist krystallinisch und bildet weisse Schüppchen und löst sich im H_2O schwer. Es ist nach Homolle und Quevenne ein Gemenge von Digitalin, Digitaline und Digitalose. Ausser dem «la digitaline» und Homolle²⁾ in den Blättern noch Digitalosin, la digitalidine und la digitalide.

Digitaline und Digitalin von Kosmann. Kosmann³⁾ hat im Wesentlichen nach Homolle ein von Kosmann Digitaline genanntes Präparat dargestellt und die Formel $C_{54}H_{45}O_{30}$ aus der Analyse desselben berechnet. Beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure soll es in Digitaliretin und Zucker zerfallen, dagegen beim Kochen mit Natronlauge — in Digitalinsäure übergehen, die ihrerseits mit verdünnten Säuren gekocht in Digitaliretin und Zucker zerfällt.

Lancelot⁴⁾ hat ebenfalls ein Digitalin dargestellt, das aber wenig Beachtung fand. Dasselbe Schicksal hat das Digitalin von Lebourdais⁵⁾ erfahren.

Es folgen die zahlreichen Präparate von Walz⁶⁾. Er hat aus der Digit. pp. L. wie auch aus der Lutea L. ein Präparat dargestellt, das er zuerst «Digitasolin», später Digitalin genannt hat und das unter dem Namen «Deutsches Digitalin» bekannt ist.

Es bildet eine gelbliche amorphe Masse in 125 Th. kaltem und in 42 Th. kochendem Wasser löslich. Walz gab dafür Anfangs die Formel $C_{19}H_{16}O_9$, später $C_{56}H_{48}O_{28}$ an. Beim

1) Homolle und Quevenne, N. Repert. Pharm. 9. 1.

2) Vgl. J. Trapp, Handb. d. Pharmakognosie 2. Aufl., Bd. I., 310 (russisch).

3) Journ. Chim. méd. 22. 377; Journ. Pharm. (3) 38. 5; Bullet. de thérapeut. Tome 59, 1860, juillet p. 60 u. 297.

4) Husemann-Hilzer a. a. O. p. 1234.

5) Ann.-Chim.-Phys. (3) 24. 58.

6) Walz, Jahrb. 12. 83; 14. 20; 21. 29; 24. 86; N. Jahrb. Pharm. 322; 9. 302; 10. 319.

Kochen mit verdünnten Säuren zerfällt es nach Walz zunächst in Zucker und Digitalatin, welches letzteres dann abgetheilt durch Wasserverlust in Paradigitalatin, theilweise durch weitergehende Spaltung in Zucker und Digitaliretin verwandelt wird. Ein weiteres Präparat ist das Digitaloin, das Walz als «Digitaloinsäure» bezeichnet, es bildet schiefe abgestumpfte Prismen. In Wasser unlöslich, löslich in Weingeist und Aether. Dann folgen α -Digitalacrin und β -Digitalacrin, gelbe amorphe Substanzen, löslich in Weingeist und Aether. Endlich hat Walz noch das riechende Princip der D. pp. ermittelt und «Digitalosmin» genannt. Schwer löslich in Wasser, leicht in Weingeist und Aether.

Engelhardt¹⁾ fand 1862 in der D. pp. eine flüchtige Base, dem Aussehen und Geruche nach dem Coniin und Nicotin ähnlich.

Marmé²⁾ fand in den Digitalisblättern Inosit und Henry — Gallussäure.

In den späteren Arbeiten³⁾ von den Jahren 1872 und 1873 verbesserte Nativelle die Darstellungsmethode des krystallinischen Digitalins und brachte zugleich neue Namen, nämlich Digitalinum crystallisatum für das frühere active Digitalin und Digitalin (Digitin?) für das frühere passive Digitalin bei.

Auch Kosmann brachte eine neue Arbeit im Jahre 1874. Er glaubt, alle bekannten Digitalisbestandtheile stammten von einem leicht zersetzbaren Princip der Digitalispflanze ab.

Die ersten Versuche über die Nativelle'schen Präparate stellte in Deutschland Schroff⁴⁾ an. Sehr eingehende Untersuchungen darüber sowohl in chem. wie in physiolog. Beziehung führte später N. Görz⁵⁾ unter R. Böhm aus. Er studirte d

1) Trapp a. a. O.

2) Annalen 129 (1864) 222. Jahresb. 1864. 203 (citirt nach Flügelger a. a. O.)

3) Nativelle, Journ. de Pharm. et de Chim. T. 16. 4. Sér. Decembre 1872. p. 430. — T 20, p. 81. — Kosmann ebendas. p. 427.

4) Schroff, Wochenbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien f. 1868, Nr. 1—4 und 20—22.

5) Diss. Dorpat, 1873.

Eigenschaften des krystallisirten Digitalins. Digitin ist ein Glycosid von der Formel $C_4H_9O_2$. Das Digitalein Nativelle's ist nach ihm ebenfalls ein Glycosid von der Formel $C_4H_7O_2$.

Von all den erwähnten Stoffen sind also besonders 2 hervorzuheben, die eine Bedeutung erlangt haben: das deutsche Digitalin (Walz) — amorph. Pulver, leicht lösl. in Aq. und Alcohol, schwer in Chlorof. und Aether — und das französische Digitalin (Homolle und Nativelle), dass sich leicht in Chloroform löst, schwer in Wasser und Alcohol. Das deutsche Digitalin besteht nach Schmiedeberg im Wesentlichen aus Digidalein (s. u.); das französ. Digitalin (Digitalin Homolle's) — aus Digitoxin und Digitogenin und endlich das Digitalin Nativelle's fast aus reinem Digitoxin.

Aus der vorausgegangenen Darstellung ergibt sich, dass im Fingerhute jedenfalls mehrere verschiedene theils wirksame, theils unwirksame Stoffe enthalten sind, dass aber von einer Reindarstellung derselben nicht die Rede sein kann. Es sind nämlich alle Präparate und Handelssorten bloß Gemengen pharmakologisch wirksamer und zahlreicher unwirksamer Substanzen, die theils fertig gebildet in der Pflanze vorkommen, theils Zersetzungsproducte der letzteren sind. Es bedurfte neuerer Arbeiten und da trat O. Schmiedeberg¹⁾ mit seinen grundlegenden Untersuchungen auf diesem Gebiete auf.

Es gehört nicht in den Rahmen meiner Arbeit eine ausführliche Schilderung seiner classischen Untersuchungen hier vorzuführen, da ich es nicht besser thun zu können glaube, als er es selbst gethan hat. Ich verweise daher auf seine Arbeit im Original, die ich nur der Orientirung wegen hier in extenso besprechen will.

Schmiedeberg benutzte zu seinen Untersuchungen nicht die Pflanze selbst, sondern verschiedene Handelssorten des deutschen Digitalins, die sich als Gemengen aus 7—8 verschiedenen Substanzen zusammengesetzt erwiesen, unter denen 4 als pharmako-

1) Schmiedeberg, O., Untersuchungen über die pharmakol. wirksamen Bestandtheile der Digitalis purpurea L., Arch. für exp. Pathol. und Pharmacol. Band III, pag. 16 f.

logisch wirksame sich auszeichnen. Zu den letzteren muss aber noch der wirksame Antheil des Nativelle'schen Digitalins gerechnet werden (Digitoxin), der in den deutschen Digitalinen (in Wasser löslichen) nicht enthalten ist.

Als genuine, pharmakologisch wirksame Substanzen, deren Zersetzungsprodukte die Hauptmasse der übrigen Bestandtheile der Digitalinarten und wohl auch der Digitalis bilden, sind in erster Reihe die folgenden zu bezeichnen:

1. Digitonin (saponinartig).
2. Digitalin, in Wasser unlöslich, wirksamer Bestandtheil des von Homolle «Digitaline» genannten Präparates.
3. Digitalein, in Wasser löslich.
4. Digitoxin (am stärksten wirkend), Hauptbestandtheil des Nativelle'schen Digitalins.

1. Schmiedeberg versichert, dass das Digitoxin, sowie alle übrigen gleich anzuführenden nicht krystallisirbaren Digitalinbestandtheile, kein Gemenge, sondern höchstens mit geringen Mengen fremder Bestandtheile verunreinigt ist. Das Digitoxin ist eine weisse, amorphe, in Wasser leicht lösliche und dabei selbst in sehr verdünntem Zustande stark schäumende Substanz. Es ist ein Glycosid von der Formel $C_{31}H_{53}(52?)O_{17}$. Beim Kochen mit sehr verdünnten Mineralsäuren zerfällt es in Zucker und 2 nicht krystallisirbare Producte, Digitoresin und Digitonein. Letzteres, in alkoholischer Lösung 20—24 Stunden lang mit verdünnter Schwefel- oder Salzsäure gekocht, bildet das schön krystallisirende Digitogenin. Ein mit dem Digitogenin übereinstimmendes, jedoch nicht demselben nicht identisches Product wurde durch eine Art von Gährungsprocess aus dem Digitonin erhalten — das Paradigitogenin. Es soll dieselbe Substanz sein, welche Homolle und Quevenne ¹⁾ «Digitalose» genannt haben.

Die angeführten Zersetzungsproducte des Digitonins bilden in mehr oder weniger reinem Zustande oder in verschiedenen Verhältnissen mit einander, sowie mit den pharmakologisch

1) Archives de physiologie par Bouchardat. Janv. 1854. p. 44.

wirksamen Digitalisbestandtheilen und deren Zersetzungsproducten gemengt die zahlreichen Stoffe, die von den verschiedenen Autoren aus der Digitalis erhalten wurden. So soll das Digitalin von Homolle und Quevenne¹⁾, sowie von Kosmann¹⁾ Digitonein gewesen sein, während das Digitaliretin aus letzteren mehrere Spaltungsproducte des Digitonins, darunter vielleicht das Digitogenin sowie andere Digitalisbestandtheile enthalten haben mag. Das Nativelle'sche Digitin fand Schmiedeberg im Wöhrlin'schen²⁾ Digitalin.

2. Das Digitalin, welches den wesentlichen Bestandtheil von Homolle's und Quevenne's «Digitaline» bildet und neben dem Digitalein in den käuflichen löslichen Digitalinsorten kaum 2—3% ausmacht, ist ein Glycosid von der Formel $(C_5H_5O_2)_n$, ein farbloser³⁾, kaum in kaltem, etwas leichter in kochendem Wasser, leicht in Alcohol, sehr wenig in Aether und Chlorophorm löslicher Körper. Auch in verdünnter Essigsäure ist er, besond. in der Wärme, in bedeutenden Mengen löslich. Obgleich es in Wasser fast unlöslich ist, so wird es doch bei Gegenwart von Digitonin und Digitalein von diesen zum Th. in Lösung gehalten. Es spaltet sich beim Kochen mit Alcohol und sehr verdünnter Salzsäure in Glycose und Digitaliresin (harzartiger Körper). Ganz besonders hervorzuheben ist die Brom-Schwefelsäurereaction auf Digitalin, wobei jene prachtvolle rothe Färbung, die nicht mit Unrecht mit der Farbe der Blüthe von *D. pp.* verglichen worden ist, erhalten wird. Schmiedeberg betont auch in Bezug auf diesen Körper, dass derselbe vollkommen rein und einheitlich ist.

2. Das Digitalein, welches den Hauptantheil der löslichen Digitalinsorten bildete, ist eine ziemlich stark gelb gefärbte, in Wasser leicht lösliche dabei schäumende Substanz (auch Glycosid). Zerfällt bei entsprechender Behandlung ebenfalls in Glycose und einen harzartigen Körper, höchst wahrscheinlich auch Digitaliresin.

1) a. a. O. p. 50.

2) Schmiedeberg, O., a. a. O. p. 17.

3) Die käuflichen Digitalinpräparate enthalten regelmässig einen gelblichen, angeblich Chrysophansäure bedeutenden, Körper (vgl. H. Paschkis, a. a. O. p. 199.), von dem das Digitalin sorgfältig gereinigt werden muss (Schmiedeberg, a. a. O. p. 29.)

4. Das Digitoxin ($C_{41}H_{72}O_{17}$) ist kein Glycosid und bildet perlmutterglänzende Nadeln, völlig unlöslich in Wasser wie in Benzol, löslich in Chloroform, heissem Alcohol, weniger in Aether und kaltem Alcohol. Bei entsprechender Behandlung geht es in das nicht krystallisirbare Toxiresin über (keine Glycose dabei). Letzteres heftig wirkende Gift bildet nach Schmiedeberg ausnahmslos einen minderen oder grösseren Antheil aller überhaupt käuflichen Digitalinsorten. Ueber die pharmakologischen Wirkungen des Toxiresins hat H. Perrier¹⁾ eingehende Untersuchungen angestellt.

Gleich nach der Entdeckung (1874) der Schmiedeberg'schen Digitalispräparate stellte gleich sein Schüler Robert Koppe²⁾ darüber pharmakologische Untersuchungen an, aus denen ich an dieser Stelle nur das hervorheben will, dass er unter den pharmakologisch wirksamen Stoffen bloss quantitative Differenzen gefunden hat. Das stärkste ist das Digitoxin, welches bei *Rana temporaria* schon zu $\frac{1}{10}$ mg, sicher zu $\frac{1}{2}$ mg in 5 bis 7 Min. systolischen Ventrikelstillstand hervorruft und zu 1—3 mg. in etwa $\frac{1}{2}$ Stunde das Thier lähmt. Reines Digitalin und Digitalein führen bei derselben Thierspecies zu $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ mg. systolischen Herzstillstand und zu 2 mg Muskellähmung³⁾ herbei.

Wie oben bereits erwähnt, stellte Schmiedeberg seine Stoffe aus käuflichen Digitalinsorten dar. Das veranlasste H. Paschkis⁴⁾ den Versuch zu machen, aus den Blättern die Schmiedeberg'schen Präparate darzustellen und zwar aus den Blättern nicht der *D. pp.*, sondern der in Oesterreich heimischen *D. ambigua* Murr. Paschkis folgte genau den trefflichen Vorschriften Schmiedeberg's in Bezug auf die Darstellung und erhielt auch Produkte, die sowohl in chemischer wie auch in physiologischer Beziehung mit den Schmiedeberg'schen identisch sind. Gross Hoffnung auf die praktische Verwerthung derselben hegt aber Paschkis nicht, obwohl er sein Digitalein als reiner und von sehr geringer Toxicität hervorhebt.

1) Perrier, H., Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. Bd. IV. p. 191

2) Koppe, R., Diss. Arch. Bd. III, p. 274 f. Auch als Diss. Dorpat, 1877

3) Koppe, a. a. O. p. 300.

4) Paschkis, a. a. O.

Trotz der ausgezeichneten und viel besprochenen Abhandlung Schmiedeberg's gelangte doch auch bis auf den heutigen Tag kein reines Digitalin in den Handel (das neueste Merk'sche crystallisirte Digitalin nicht ausgenommen); die übrigen wirksamen Digitalisstoffe des Handels haben einen gewissen Grad der Reinheit wohl erreicht. Ich hebe in dieser Hinsicht eine vom Jahre 1885 von Brouardel¹⁾ referirte Studie von Lafon²⁾ hervor, wonach in Frankreich unter dem Namen *crystallisirtes* und *amorphes Digitalin* und *granules de digitaline* eine Reihe von Produkten vorhanden sind, welche keine Spur von Digitalin enthalten. Dann soll das Merk'sche Digitalin die nach Lafon für Digitalin charakteristische Reaction nicht geben, nämlich auf Zusatz weingeistiger Schwefelsäure und einer Spur Eisenchlorid — eine dauernde blaugrüne Färbung. Diese Reaction soll sehr scharf sein und es ermöglichen unter günstigen Bedingungen (nicht zu langer Dauer der Intoxication) nicht nur im Inhalte des Verdauungstractus, sondern auch selbst in den inneren parenchymatösen Organen den Nachweis des Digitalins zu führen. Alle sonstigen Methoden, die Herzgifte, wenigstens im Harne, nachzuweisen, haben ein negatives Resultat ergeben, nur Brandt³⁾ und Dragendorff haben zwei Mal im Harne von Katzen Digitalin nachweisen können.

Das Digitalin von Gehe untersuchte Prof. Kobert 1884 und fand dasselbe wirkungslos.

Es liegen weitere genaue chemische Untersuchungen der sog. reinen Digitalisbestandtheile von der allerletzten Zeit (1891) vor, nämlich von Kiliani⁴⁾: «Zur Kenntniss des Digitonins» und von Houdas⁵⁾: «Recherches sur la digitaléine». Danach soll das neueste Fabrikat von Merck: Digitalin. crystallisatum

1) Brouardel, P., Des caractères chimiques des diverses espèces de digitaline. Bull. de l'Acad. de méd. Nr. 16. p. 528.

2) Lafon, Ph., De la digitaline française, de la digitaline et de la digitoxine d'Allemagne. Ann. d'Hyg. publ. T. XV. Nr. 16. p. 527.

3) Brandt, A., Experimentelle Studien über die forensische Chemie der Digitalis und ihrer wirksamen Bestandtheile. Diss. Dorpat, 1869. p. 34.

4) Kiliani, H., Berlin. chem. Berichte 24, 1891, p. 3951; ebendas. XXIII, 1555; ebendas. XXIV, 340.

5) Houdas, Compt. rend. 113, 648.

nahezu oder völlig reines Digitonin sein. Houdas behauptet ferner, das Digitonin in 2 Glycoside zerlegt zu haben. Die Formel desselben soll $C_{27}H_{46}O_{14}$ sein. Die Löslichkeit des Digitonins soll in 50 Th. 50 % Alcohols am besten sein.

Fouquet¹⁾ berichtet über eine Untersuchung, welche er angestellt hat über die Wirkung: 1) des krystallisirten Digitalins der französischen Pharmakopoë, welches nach Arnaud ein chemisch reiner Körper ist; 2) über die Wirkung des amorphen Digitalins der französ. Pharmakopoë; 3) des deutschen Digitalins und des Digitaleins, welches von Adrian hergestellt wurde; 4) des deutschen Digitalins, welches identisch ist mit dem französischen Digitalein. Es wurde experimentirt an Fröschen, Kaninchen und Hunden. Schlüsse: In der Digitalis existirt ein wohl definirbares actives Princip, welches alle Eigenschaften der Pflanze repräsentirt. Dieses ist das Digitalin. Ausser dem Digitalin kommen in den Handelspräparaten, welche den Namen Digitalin führen, andere Bestandtheile vor. Man muss daher diese Handelsdigitaline in 2 Gruppen theilen, je nachdem ob sie in Chloroform löslich sind und in Wasser unlöslich oder umgekehrt.

1. Gruppe der Handelsdigitaline. Sie bestehen aus einem Gemisch von krystallinischem Digitalin, amorphem Digitalin und Digitoxin.

2. Gruppe der Digitaline, welche unlöslich sind in Chloroform und löslich in H_2O . Hierher gehört das deutsche Digitalin und das Digitalein.

Die Substanzen der 1. Gruppe des Handels kann der Arzt ohne Weiteres mit Erfolg anwenden.

1) Fouquet, Bulletin général de Thérapeutique. 1892.

II. Physiologischer Theil.

Schon bald nach Withering wurden Versuche an Fröschen von zahlreichen englischen Autoren angestellt und so auch später in unserm Vaterlande, unterlies es fast kein Autor, der sich mit der Digitalisfrage beschäftigte, an beiden Thierarten, sowohl an Kaltblütern als auch an Warmblütern parallel zu experimentiren. Dementsprechend wollen wir auch die einschlägige Litteratur nach diesen zwei Richtungen hin gesondert anführen ¹⁾.

1. Wirkungen an Kaltblütern.

Circulationssystem. Die ersten Versuche an Fröschen verliefen, ohne dass dabei das Verhalten der Herzthätigkeit Berücksichtigung gefunden hätte. In Deutschland wiederholte die Versuche an Fröschen Stanius ²⁾, kam aber zu negativen Resultaten, obwohl er die Herzwirkung an Katzen wohl constatirt hatte.

Der erste, der die charakteristischen Digitalinwirkungen an Kaltblütern beschrieben hat, war Vulpian ³⁾. Er beobachtete nämlich die unregelmässigen (später peristaltische genannt) Ventrikelcontractionen und den systolischen Ventrikelstillstand. Diese Wirkungen studirten später Dybkowski und Pelikan ⁴⁾ und noch später Böhm ⁵⁾.

Die Erscheinungen sind im Wesen dieselben bei Kalt- und Warmblütern, die ersteren aber leichter und gründlicher zu er-

1) Die hier nun folgende Schilderung geschieht hauptsächlich an der Hand der Abhandlung von O. Schmiedeberg: «Beiträge zur Kenntniss der pharmakologischen Gruppe des Digitalins» im Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. Bd. XVI. p. 166 f.

2) Arch. d. physiol. Heilk. X. 177. 1851.

3) Gaz. méd. de Paris, 1885. p. 559.

4) Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. XI. S. 279. 1862.

5) Böhm, Pflüger's Arch. Bd. V. S. 158. 1872.

kenen, weil das Herz blossgelegt und selbst losgelöst vom Organismus untersucht werden kann. Die Erscheinungen am Froschherzen, die unter solchen Versuchsbedingungen nach Verabreichung von Digitalis beobachtet werden, lassen sich am leichtesten übersehen, wenn man ihren Verlauf in folgende Stadien theilt.

1. Zunahme des Pulsvolums unter Vergrösserung der diastolischen Phase und ohne Veränderung der absoluten Leistungsfähigkeit des Herzens (Williams¹⁾).

Der Ventrikel erscheint in der Diastole ausgedehnter und stärker mit Blut gefüllt; in der Systole dagegen zusammengepresster, ganz blass (weil blutleer) und länger in dieser Stellung verweilend. Befindet sich das Herz überdies in einen künstlichen Kreislauf eingeschaltet, so lässt es sich durch einfache Messungen feststellen, dass die Blutmenge, welche bei jeder Systole ausgespresst wird, grösser geworden, der Druck aber, unter dem dies geschieht, der gleiche geblieben ist. (Williams¹⁾, Dreser²). Letzterer Umstand, der die Leistungsfähigkeit oder absolute Kraft des Froschherzens betrifft, ist noch auf andere Weise bewiesen worden, es ist nämlich der Druck einer auf das Froschherz lastenden Flüssigkeitssäule gemessen worden, die gerade ausreicht, um durch ihren Widerstand das Eintreten der Herzcontractionen zu verhindern, und dabei überzeugte man sich, dass der Druck in diesem Stadium der Digitalinwirkung weder eine Verminderung noch eine Erhöhung erfährt.³⁾

2. Unregelmässige, sog. peristaltische Herzbewegungen, in dem anfänglich nicht alle Theile des Herzens gleichmässig von der Wirkung betroffen werden und daher die Contraction und Erschlaffung verschiedener Herztheile zu verschiedener Zeit erfolgt.

1) Arch. f. exp. Pathol. und Pharmacol. Bd. XIII. S. 1. 1880.

2) Dreser, H., Über Herzarbeit und Herzgifte. Leipzig 1887. Separatabdruck aus d. Arch. f. exp. Pathol. und Pharmacol. Bd. XXIV.

3) Schmiedeberg, O., Grundriss d. Arzneimittellehre. 2. Aufl. Leipzig, 1888.

Auch die Vorhöfe können an den sog. peristaltischen Bewegungen theilnehmen; die letzteren erfolgen bisweilen ungemein typisch, so dass oft lange Zeit hindurch ganz regelmässig erst eine, dann eine zweite Stelle sich hervorbaucht ¹⁾. Gewöhnlich ist die Spitze des Ventrikels derjenige Theil, der zuerst definitiv contrahirt bleibt, während die letzten partiellen Diastolen (meist in der Mitte des Ventrikels stattfinden ¹⁾). Man darf aber gar nicht annehmen, dass Herzperistaltik nur bei Substanzen der Digitalingruppe vorkommen. Dieselbe findet sich vielmehr auch bei Substanzen, die derselben ausserordentlich fernstehen, wie z. B. beim Aconitin ²⁾.

3) Systolischer Stillstand des Ventrikels, dem bald ein vielleicht ebenfalls systolischer Stillstand der Vorhöfe folgt.

Allmählich verliert ein Theil des Ventrikels nach dem anderen die Fähigkeit in den Zustand der Diastole überzugehen, so dass zuletzt der ganze Ventrikel im Zustande systolischer Contraction stillsteht, während die strotzend gefüllten Vorhöfe sich vergeblich abmühen ihr Blut zu entleeren ³⁾. Beim systolischen Stillstande befindet sich der Ventrikel meist im maximum der Contraction, doch kann auch der Stillstand bisweilen derart stattfinden, dass direkte Reize eine noch stärkere systolische Zusammenziehung des stillstehenden Herzens hervorrufen ¹⁾. Die Erscheinung tritt in gleicher Weise an der isolirten Herzspitze ein, es wird also ohne Zweifel die Muskelsubstanz selbst von der Wirkung betroffen und nicht etwa neuromusculäre Apparate, denn durch Vagusreizung gelingt es nicht, das stillstehende Herz zur Diastole zu bringen. Dehnt man dagegen während des systolischen Stillstandes den Ventrikel des am künstlichen Kreislauf befestigten oder auch in situ befindlichen Herzens gewaltsam durch einen Flüssigkeitsdruck (durch Erhöhung des venösen Druckes) resp. durch einen auf den Unterleib ausgeübten Druck (Schmiedeberg'scher Versuch) aus, so treten wieder, so lange die Ausdehnung unterhalten wird, regelmässige kräftige Contractionen

1) Harnack, E., Lehrb. d. Arzneimittel- u. Arzneiverordnungslehre. 1883. p. 778.

2) Vgl. Wagner, Diss. Dorpat.

3) Tappeiner, H., Lehrb. d. Arzneimittellehre. 1890. p. 210.

ein¹⁾ und nach dem Auflösen der Ausdehnung erst dann wieder vollständig schwinden, wenn der Ventrikel in die systolische Stellung zurückgekehrt ist.

4. Schliesslich tritt vollständige Lähmung, d. h. der Tod des Froschherzens ein. Das letztere zeigt äusserlich dieselbe Beschaffenheit wie im vorigen Stadium. Es behält seine systolische Stellung bei und kehrt auch nach gewaltsamer Ausdehnung in diese zurück; aber Pulsationen können durch kein Mittel mehr hervorgerufen werden.

Diese Wiederherstellung der Bewegung des Ventrikels bei Ueberführung in diastolische Stellung durch mechanische Ausdehnung und die Rückkehr in die systolische Stellung mit dem Aufhören derselben, auch wenn der Herzmuskel inzwischen unregbar geworden, beweisen nach Schmiedeberg, dass es sich bei den charakteristischen Wirkungen der Digitaline auf den Herzmuskel nicht um Veränderungen der Contractilität (etwa um eine Art Tetanus), sondern um solche der Elasticität handelt. Das Wesen der Digitalinwirkung besteht somit nach Schmiedeberg in einer eigenartigen Veränderung der Elasticitätsverhältnisse des Herzmuskels, welche zunächst zur Vergrösserung des Pulsvolums und Verlängerung der Systole und dann zu dauerndem Stillstande des Ventrikels in systolischer Stellung führt.

Schmiedeberg ist nun der Meinung, dass alle diese Veränderungen Folge einer gradatim fortschreitenden Vergiftung des Herzmuskels durch Digitalinstoffe sind, wobei unter dem Einflusse des Digitalinstoffes eine chemische (moleculare) Alteration des Herzmuskels vor sich geht, die aber auch nach Aussetzen des Mittels noch einige Zeit (Tage bis Wochen lang) fortbesteht, ob durch erschwerte Ausscheidung (Cumulation) oder durch Nachwirkung (moleculare Veränderung des Muskels) ist

1) Schmiedeberg, O., Ueber die Digitalinwirkung am Herzmuskel des Frosches. Beiträge zur Anat. u. Physiol. Festgabe an C. Ludwig. Leipzig. 1874.

nicht festgestellt, um schliesslich dem status quo ante Platz zu machen.

Kunkel¹⁾ stellt eine neue sogenannte «Quellungstheorie» auf über das Wesen der Muskelcontraction überhaupt: Wassertheilchen, die in Ruhestellung des Muskels in der Längsrichtung der Fasern sich befinden, lagern sich während der Contraction in Querrichtung um und umgekehrt. Quillt der Muskel aus irgend einem Grunde, — was immer in der Querrichtung sich vollzieht, — so werden die Wassertheilchen in ihrem Umlagerungsvermögen, folglich auch die Contraction, gestört. Wird dem Muskel Wasser entzogen, so wird seine Contraction begünstigt. Nun wirken viele Muskel- und Herzgifte, darunter Digitalin, derart, dass sie durch Alteration der Gefässwände dem Muskel Wasser entziehen, wodurch seine Reizbarkeit und selbst die Zuckungsgrösse erhöht werden. Die Digitaline sollen demnach nichts Specificisches, sondern eben vielmehr Gemeinsames mit vielen anderen dem Muskel Wasser entziehenden Giften haben.

Bahadurji²⁾, führt die peristaltischen Bewegungen des Ventrikels auf das Bestreben desselben in contrahiertem Zustande zu verbleiben zurück.

Boehm³⁾ fand bei Versuchen mit käuflichem Digitalin an Fröschen eine Zunahme der Erregbarkeit der Herzhemmungsapparate. Dieselbe Beobachtung an Fröschen machte Miliejew⁴⁾ bei seinen Versuchen mit Extr. Strophanthi.

Nach Sergiejenko⁵⁾ soll die Hauptwirkung des Adonidins sowohl in Beeinflussung des Herzmuskels als auch der Herzganglien bestehen. Diese sollen bis zu Ende der Vergiftung ihre Erregbarkeit behalten, denn nach bereits erfolgtem systolischen Stillstande können noch auf mechanische, chemische oder electricische Reize oder selbständig nach einer gewissen Pause,

1) Kunkel, A. J., Ueber eine Grundwirkung von Giften auf die quergestreifte Muskelsubstanz. Arch. f. d. gesammte Physiol. 1885. Bd. XXXVI, p. 353 f.

2) Compt. rendus de la Société de Biologie, 2. Juli 1887. p. 425.

3) Boehm, Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. V. S. 164. 1872.

4) Miliejew, F. F., Materialien zur Pharmakologie der Sem. Strophanthi Combé. Diss. S.-Petersb. 1888.

5) Sergiejenko, N. Kasan, Untersuchungen über die Wirkung des Adonidins. Gaz. Lek. VIII. 32. 1888.

wie nach einer Erholung wiederkehren. Das Herz hört auf zu schlagen wegen Veränderungen im Muskel, dessen Contractilität wächst, dessen Fähigkeit zur Diastole dagegen erlischt. Im Vergiftungsstadium steigt die electriche Erregbarkeit der peripheren Abschnitte der Vagi.

Stockwis¹⁾ fand eine Zunahme der Pulsfrequenz an Froschherzen durch Digitalin Merck, Helleborein und Strophantia. Ferner soll der Temperaturgrad einen unverkennbaren Einfluss auf die Dosis haben, die zur Erlangung einer bestimmten functionellen Modification der Herzthätigkeit erforderlich ist. Wenn bei verschiedenen Temperaturen dieselben Wirkungen hervorgerufen werden sollen, so wird dazu eine Menge erforderlich, die im Allgemeinen umgekehrt proportional der Höhe der T^0 ist, bei der die Wirkung stattfindet. Durch die T^0 werden also nicht die Schnelligkeit und die Intensität, nicht die Art der Wirkung dieser Stoffe auf das isolirte Herz beherrscht. Das Wesen der Wirkung der Digitalinstoffe besteht in einer hochgradigen, bis zur Erschöpfung steigenden Anregung des Stoffwechselprocesses des Herzens und ist gleich allen anderen den Stoffwechsel anregenden Bedingungen, wie mechanische, chemische und electriche Reize.

Mays²⁾ vindicirt dem Digitalin die Fähigkeit bei kleineren Dosen (1 : 40,000) Steigerung der Herzthätigkeit und bei grösseren (1 : 1000) selbst systolischen Stillstand durch Einwirkung auf den nervösen Herzmechanismus hervorrufen zu können.

Donaldson und Warfield³⁾ fanden bei Versuchen über die Wirkung des Digitalins aufs Herz der Schildkröte *Pseudemys rugosa* folgendes:

1) Stockwis, B. J., Over de werking van eenige stoffen uit de digitalisgroep op het geïsoleerde kik vorschhart bij verschillende temperaturen. Bijdrage tot de kennis van den invloed der temperatuur op de werking van geneesmiddelen. Nederl. Tijdschr. voor Geneesk. Festbundel. Donderd. Jubil. S. 465. 1888.

2) Mays, Thomas J. (Philadelphia), On the therapeutics of digitalis. New-York med. Rec. June 13; p. 647. 1885.

3) Donaldson, H. H. and Warfield, M., The influence of digitaline on the work done by the heart of the slider terrapin (*Pseudemys rugosa*, Shaw.). Johns Hopkins University, Baltimore. Studies from the Biological Laboratory. Vol. II, Nr. 3, June 1882.

1. Wenn das Herz normal arbeitet vor dem Zusatz des Digitalins, so nimmt die Leistung desselben nach dem Zusatze nicht zu, sondern ab; je mehr Gift, desto stärker die Verringerung der Leistung.

2. Kleine Dosen Digitalin wirken auf die Pulsfrequenz zunächst steigernd. Beim Froschherzen bleibt die Elasticität des Herzmuskels unter dem Einfluss mässiger Dosen von Digitalin normal, aber die Ausdehnungsfähigkeit desselben ist erheblich gesteigert. Die Hauptwirkung des Digitalins scheint überhaupt darin zu bestehen, die Ausdehnungsfähigkeit (Distensibilitas) des Herzmuskels zu steigern.

Martin¹⁾ fand bei einer experimentellen Untersuchung, dass Veränderungen des Blutdruckes nach oben hin auf die Pulsfrequenz eines isolirten und durchströmten Frosch- und Schildkrötenherzens keinen Einfluss hat.

Beyer²⁾ findet, dass Convallamarin blutdrucksteigernd wirkt, und dass diese Blutdrucksteigerung hauptsächlich einer Reizung der vasomot. Centren verdankt, welche nicht in der Med. obl. liegen. Der Puls wird wenigstens für einige Zeit an Frequenz gesteigert, die Leistungsfähigkeit des Herzens aber etwas vermindert beim Schildkrötenherzen.

Karewski³⁾ meint, dass die Digitalinwirkung in chemischen Veränderungen des Herzmuskels besteht, die zunächst zu einem Starrwerden, später zu Functionsunfähigkeit und Absterben desselben führen.

Respirationssystem. Langendorff⁴⁾ fand bei Fröschen eine eigenthümliche Modification der Athmung, die periodisch erfolgt, eine Gruppenbildung, vermuthlich infolge des Herzstillstandes.

1) Martin, H. N., Observations on the direct influence of variations of arterial pressure upon the rate of beat of the mammalian heart. Johns Hopkins University, Baltimore. Studies from the Biological Laboratory. Vol. II, July 1883.

2) Beyer, H. G., On the action of carbohc acid, atropia and convallaria on the heart; with some observations on the influence of oxygenated and non-oxygenated blood, and of blood in various degrees of dilution. Johns Hopkins etc. Vol. III, Nr. 2, 1884.

3) Karewski, Zeitschr. f. klin. Medicin. Bd. V. p. 435.

4) Langendorff, Arch. f. Physiologie. 1881. p. 334.

Centralnervensystem. Man beobachtet an Fröschen eine Herabsetzung der Reflexerregbarkeit, die Weil¹⁾ und Meihuizen²⁾ auf Erregung reflexhemmender (Setschenow'scher) Centren bezieht, während Harnack³⁾ dieselbe durch Störungen des Kreislaufs bedingt wissen will.

Skelettmuskeln. Koppe (a. a. O.) beobachtete an Fröschen nach Digitalin, besonders aber nach Digitoxin, lähmungsartige Zustände, die er auf directe Affection der Muskulatur bezieht. Miliejew (a. a. O. p. 46) beobachtete bei Sem. Stroph. dasselbe, ausserdem aber noch eine anfängliche Steigerung der Muskelregbarkeit und bei grossen Dosen eine Beschränkung der Fähigkeit des contrahirten Muskels in erschlafften Zustand überzugehen.

In diesen Erscheinungen sieht Miliejew eine Bestätigung der Theorie von Poillon et Carville⁴⁾ über die Herzwirkung der Digitalinstoffe: Da das gesammte Blut das Herz einer relativ sehr kleinen Zeiteinheit, beim Menschen z. B. nach 32 Contractionen, d. h. weniger als in einer $\frac{1}{2}$ Min., passiert, wird desshalb der Herzmuskel von der ganzen Dose Gift einer sehr kurzen Zeit durchspült, während alle anderen Muskeln von einem nur sehr geringen Bruchtheile der applicirten Giftdose in derselben Zeiteinheit betroffen werden. Dazu kommt noch, dass die Herzmuskelfasern sarkolemmalos sind. Diese Verhältnisse genügen zur Erklärung, warum der Herzmuskel rascher und stärker afficirt wird, als alle anderen Muskeln. Diese Theorie hat auch bei Fraser⁵⁾ Anerkennung gefunden.

Die Muskeln des vergifteten Frosches verfallen relativ früher und in stärkerem Maasse der Todtenstarre, als das sonst der Fall zu sein pflegt.

Localwirkung. Miliejew (a. a. O. p. 42) beobachtete, dass diejenige Muskeln, in deren Bereiche die Injection (von Strophanth.-Samentinctur) stattfand, viel früher unerregbar werden und absterben, als alle anderen Muskeln.

1) Weil, Arch. f. Anat. u. Phys. 1871. p. 252.

2) Meihuizen, Pflügers Arch. Bd. VII. p. 201. 1873.

3) Harnack E., Lehrb. d. Arzneimittellehre. 1883. p. 783.

4) Poillon et Carville, Étude physiologique sur les effets toxiques de l'Inée, poison des Pahouins (Gabon). Arch. de physiol. norm. et pathol. 1872. p. 705—706.

5) Fraser, Brit. med. Journ. 1885.

Empfänglichkeit. An der *Rana temporaria* und der *Lacerta viridis* kommt die Digitalinwirkung leicht und in typischer Weise zu Stande; weniger vollständig an der *Rana esculenta*¹⁾ und noch schwächer oder gar nicht an Kröten (Vulpian, a. a. O.)

2. Wirkungen an Warmblütern.

Circulationssystem. Schon die erste wissenschaftliche Beobachtung bezieht sich auf das Circulationssystem — Withering spricht von einer Pulsverlangsamung. Kaum hat letzterer seine Beobachtungen am Krankenbette veröffentlicht, als dieselbe in Deutschland von Schiehm ann²⁾ an Thieren bestätigt wurde, wobei S. fand, dass *Digitalis* für die Niere ein gutes Resolvens wäre. Thierexperimente mit *Digitalis* sollen aber in England lange vor Schiehm ann und selbst noch vor Withering angestellt worden sein und zwar von Solerne im Jahre 1748 an Truthühnern.

Aber nicht nur die Pulsverlangsamung, sondern alles Wesentliche der *Digitalis*wirkung erkannten schon zu Anfang dieses Jahrhunderts die englischen Aerzte. Beddoës³⁾ überzeugte sich durch ein näher nicht beschriebenes Instrument, dass die D. die Stärke der Circulation vermehre, wobei er eine Vermehrung der Contractilität der organischen Faser anzunehmen geneigt war. Mossman⁴⁾ und Kinglake⁵⁾ schreiben der

1) Schmiedeberg, O., Ueber die Digitalinwirkung am Herzmuskel des Frosches. Beiträge zur Anat. u. Physiol. Festgabe an C. Ludwig. Leipzig, 1874.

2) Schiehm ann, E. C., Diss. inaug. med. de digitali purp. Goettingae 1786. 63 pp. Enthält die ganze ältere Litteratur.

3) Beddoës, Observations on the medical and domestic management of the Consumptive; on the powers of *Digitalis purpurea*; and on the cure of Scrofula. London 1801. Der Abschnitt: On the Power and Agency of *Digitalis*. p. 15.

4) Nach Bidault de Villiers, Essai sur les propriétés médicales de la digitale purpurée. 3-me édit. Paris 1812.

5) R. Kinglake, Cases and Observations on the medical efficacy of *Digitalis purpurea* in phthisis pulmonalis, with speculations on its modus operandi, and on analogous remedies. London 1801. Als Appendix Nr. 1 enthalten in dem oben citirten Werke von Beddoës.

Digitalis direct eine Wirkung auf das Herz und die Gefäße zu die Thätigkeit des Herzens und der Arterien vermehrt sich. Diese wussten schon also nicht minder als wir über die Digitalinwirkung.

John Ferriar¹⁾ beobachtete eine Steigerung der Diurese, blieb aber der Meinung, die Pulsverlangsamung wäre das Wesentliche bei der Digitalinwirkung.

Traube gab zuerst die Erklärung für die Pulsverlangsamung in der Vagusreizung, wobei er aber eine Blutdruckherabsetzung dabei annahm, da kurz zuvor Hoffa und Ludwig nachgewiesen hatten, dass eine Reizung des Vagus den Blutdruck herabsetze.

Blake²⁾ war der erste, der eine Blutdrucksteigerung nach D. und dabei eine directe Wirkung auf das Herz, dessen Pulsationen zum Schluss schwächer werden sollen, beobachtete. Er nahm aber auch eine Wirkung auf die Capillaren an.

Briquet³⁾ beobachtete die Blutdrucksteigerung während der Pulsverlangsamung. In demselben Jahre fand Lenz unter Bidder nach Digitalin während der Pulsverlangsamung ebenfalls eine Blutdrucksteigerung.

Erst aus dem Jahre 1861 stammen von Traube⁵⁾ Mittheilungen über die Blutdrucksteigerung, die wie die Pulsverlangsamung auf Reizung des muskulomotorischen resp. regulatorischen Nervensystems des Herzens beruhe. Die anfängliche Reizung geht aber später in eine Lähmung über, die Pulsbeschleunigung und Blutdruckerniedrigung nach sich zieht. An ein

1) Ferriar. An Essay on the medical properties of the Digitalis purpurea or Foxglove. London and Manchester 1799.

2) Blake, Edinburgh med. Journ. April 1839.

3) Briquet, Traité thérapeutique du quinquina. Paris 1853.

4) Lenz. Experim. de rat. inter. puls. frequentiam, sanguinis pressionem lateralem et sanguinis fluentis celeritatem obtinente. Diss. Dorpat. 1858.

5) Medic. Centralzeitung 32. Jahrg. 83. Stück. 6. u. 30 Nov. 1861

Wirkung auf den Herzmuskel scheint Traube nicht gedacht zu haben ¹⁾).

Es folgten weitere Untersuchungen über die Wirkung der Digitalis von Winogradoff ²⁾, Bezold ³⁾, Marmé ⁴⁾, Brunton ⁵⁾, Ackermann ⁶⁾, Boehm ⁷⁾, Boehm und Goerz ⁸⁾. Die letzteren 3 Autoren führten lange einen wissenschaftlichen Streit über die Betheiligung des vasom. Centr. bei der Blutdrucksteigerung und kamen zu dem Schluss, dass dasselbe dabei keine Rolle spielt.

Boehm, Goerz und namentlich Williams ⁹⁾ wollen nachgewiesen haben, dass die Blutdrucksteigerung nur von einer Einwirkung der Digitalinstoffe auf das Herz abhängt und dass die Verengung der Gefäße durch Erregung der Gefäßnerven oder Muskulatur dabei keine Rolle spiele. Dagegen haben eine ganze Reihe namentlich englischer Autoren schon von jeher — von R. Kinglake (s. a. a. O.) an bis in die neueste Zeit hinein — auf die Contraction der Gefäße beim Zustandekommen der Blutdrucksteigerung ein besonderes Gewicht gelegt. Besonders zahlreiche und beweiskräftige Versuche nach dieser Richtung hin unternahmen in den letzten Jahren R. Kober ¹⁰⁾ und sein Schüler

1) Traube, Gesammelte Beiträge zur Pathologie und Physiologie. Bd. I. S. 252. Berlin 1871.

2) Winogradoff, Virchow's Archiv. Bd. 22. 1861. S. 457.

3) Untersuchungen über die Innervation des Herzens. 2. Abth. Leipzig 1863. S. 205, Vers. XXXII.

4) Marmé, Ztschr. f. rat. Med. XXVI. 1864.

5) Brunton, On the Digitalis. London 1868.

6) Ackermann, Tageblatt der Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Rostock 1871. Berlin. klin. Wochenschr. 1872. Nr. 3. Ueber die Wirkung der Digitalis. Samml. klin. Vorträge von Volkmann, Nr. 48. Deutsch. Arch. f. klin. Medic. Bd. XI. S. 125. 1872.

7) Boehm, Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. V. S. 186. 1872.

8) Goerz, N., Diss. Dorpat 1873. II. Abth.

9) Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. Bd. XIII. S. 2. Curve 1 auf Taf. II.

10) Kober, R., Ueber die Beeinflussung der periph. Gefäße durch pharmakol. Agentien. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. Bd. XXII. 1886 p. 76.

H. Thomson ¹⁾ an sogenannten «überlebenden» künstlich durchströmten Organen, wo Zusatz von Digitalinen schon in minimalster Verdünnung zum Blute eine unzweifelhafte, oft sehr erhebliche nur auf Verengung des Strombettes zu beziehende Abnahme der Ausflussgeschwindigkeit hervorbringt. Nur an der Milz und Niere bewirkt Digitoxin, namentlich aber Digitalin, zunächst eine Erweiterung und dann erst eine Verengung der Gefässe. Dasselbe Verhalten der Nierengefässe beobachtete Zotos ²⁾ dem Cerberin gegenüber. Ob die Wirkung eine neuromuskuläre oder rein muskuläre ist, hat man nicht festgestellt.

Bemerkenswerth ist, dass Rothenberg ³⁾ bei seinen Durchströmungsversuchen an Fröschen mit (allerdings käuflichem) Digitalin gar eine Erweiterung der Gefässe constatirt hat. Die Veränderungen der Pulsfrequenz hat auf die Blutdrucksteigerung keinen Einfluss (Atropin! Schmiedeberg). Die Blutdrucksteigerung ist die einzige therapeutisch wichtige Digitalinwirkung, von der fast alle übrigen Digitalinwirkungen abhängen, namentlich auch die Pulsverlangsamung.

Die Pulsverlangsamung beruht sowohl auf einer durch die Blutdrucksteigerung bedingten Reizung des Vagus ⁴⁾ im Centrum, denn nach Durchschneidung des Vagus ist die Pulsverlangsamung minder hochgradig, als auch auf einer directen peripheren Reizung des Vagus, weil nach Atropinapplication die Pulsverlangsamung ganz fehlt. Nach Boehm werden dabei die peripheren Abschnitte des Vagus durch Digitalin auch reizbarer gemacht. Bei Fröschen fehlt die Pulsverlangsamung ganz.

In den späteren Stadien der Vergiftung geht die Verlangsamung in eine Beschleunigung des Pulses über, was Traube als Vaguslähmung deutete. Wahrscheinlicher ist aber, dass nicht die Vaguslähmung, sondern die Herzmuskellähmung daran schuld ist, denn schliessliche hochgradige Beschleunigung des Pulses

1) Thomson, H., Diss. Dorpat 1886.

2) Zotos, Z. N. Diss. Dorpat 1892.

3) Rothenberg, L., Ueber den Einfluss einiger Muskelgifte auf die Weite der Blutgefässe. Diss. Würzburg 1885.

4) Traube, Ackermann u. a.

tritt auch bei Thieren mit sehr schwachem Vagustonus (Kaninchen) ein, bei denen sonst Durchschneidung der Vagi keine Pulsfrequenzveränderung hervorruft.

Die Erscheinungen, die man bei Blutdruckversuchen mit chemisch reinen Digitalinstoffen an Säugethieren beobachtet, sind nach Stadien geordnet folgende (Schmiedeberg):

1. Steigerung des normalen Arteriendruckes in der Regel, aber nicht nothwendig, von einer Verminderung der Pulsfrequenz begleitet.

2) Fortdauer des erhöhten Blutdruckes bei einer über die Norm gesteigerten Pulsfrequenz.

3) Anhaltend hoher Blutdruck mit grossen Unregelmässigkeiten der Herzthätigkeit und wechselnder Pulsfrequenz.

4) Rasches Absinken des Blutdruckes, plötzlicher Herzstillstand und Tod des Thieres.

Bei der Section, welche gleich nach dem Tode an durch digitalinartig wirkendes Cerberin vergifteten Thieren ausgeführt worden sind, fand Zotos¹⁾ meistentheils den linken Ventrikel in Systole, den rechten immer in Diastole; unter dem Endocard des linken Ventrikels und einmal aller beiden fand er Ecchymosen, welche um so besser ausgeprägt waren, je schneller die Vergiftung verlief. Dasselbe hat Openchowski²⁾ bei der Helleboreinvergiftung beobachtet und erklärt es dadurch, dass das Gebiet der linken Coronaria überfüllt und der Rückfluss aus demselben durch starke Contractionen des Herzmuskels gehemmt ist.

Respirationssystem und Centralnervensystem werden kaum von Digitalis direct beeinflusst. Alles, was zu merken ist, lässt sich auf die Circulationsänderungen zurückführen (Convulsionen, Krämpfe, Sehstörungen — Gelbsehen etc.). Das Erbrechen wird

1) Zotos, Z. N., ein Beitrag zur Kenntniss der Cerberins. Diss. Dorpat 1892. p. 24.

2) Openchowski, Th. von, Das Verhalten des kleinen Kreislaufes gegenüber einigen pharmakologischen Agentien, besonders gegen die Digitalisgruppe (Separ.-Abdruck aus der Zeitschrift für klin. Medicin. Bd. XVI, Heft 3 und 4, p. 10.)

von den Einen als centrale, von den Anderen als locale (Magen) Wirkung aufgefasst.

Die **Skelettmuskeln** werden hochgradig afficirt, ähnlich wie bei den Brechmitteln (Koppe a. a. O.), was sich bei den Thieren in Hinfälligkeit und Unmöglichkeit sich auf den Beinen zu halten äussert.

Die **Localwirkung** äussert sich bei subcutaner Application von in Wasser unlöslichen Stoffen, namentlich bei Digitoxin (Koppe a. a. O.), in schrecklichsten Phlegmonen (Koppe, Kaufmann¹⁾). Besonders aber hervorzuheben ist das Erbrechen, das die grösstmöglichen Grade erreichen kann und das sowohl bei Application des Giftes per os als auch subcutan eintritt (Koppe — Selbstversuch). Auch Durchfall, Nausea, Speichelfluss begleiten das Erbrechen.

Was die **Empfänglichkeit** betrifft, so sind Carnivoren empfindlicher gegen Digitalis als Herbivoren. Der Mensch ist gegen die Digitalinstoffe am meisten empfindlich, besonders gegen das Digitoxin, dann folgen Katze, Hund, Kaninchen — dieselbe Reihenfolge, wie bei den Brechmitteln (Koppe).

Cumulative Wirkung. Schon Bouchardat und Sandras²⁾ bemerkten die Wirkung der D. erst am 3. Tage an ihren Kranken eintreten. Am lehrreichsten auch in dieser Hinsicht ist wiederum das Experiment an sich selbst von Koppe. Worin die cumul. Wirkung begründet ist, in der erschwerten Ausscheidung des Giftes oder in einer molecularen Veränderung der Organe, die erst langsam sich ausbildet und auch nach Ausscheidung des Giftes noch eine Zeit lang fortbesteht, — das ist eine offene Frage. W. van der Heyde³⁾ gelangte auf Grund seiner Thierversuche zu der Anschauung, dass die cumul. Wirkung dieser Stoffe nicht sowohl auf Nichtaufsaugung oder Ablagerung derselben und Verhinderung der Ausscheidung beruht, als viel

1) Kaufmann, P., Ueber den Einfluss des Digitoxins auf die Entstehung eitriger Phlegmonen. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XXV, p. 397.

2) Bouchardat und Sandras, Répert. Pharm. 1. 199. Bull. gen. 14. Févr. 1851.

3) Heyde van der, W., Ueber die cumulative Wirkung des Digitalis und Helleboreins (Amsterdamer pathol. Labor.), Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XIX, S. 127.

mehr auf chemischen Veränderungen in den der Einwirkung unterliegenden Organen, indem dort als Producte des Stoffwechsels sich bildende chemische Verbindungen nur sehr langsam entstehen und zerlegt werden. Damit stimmen auch die Erfahrungen von Lafon und Brouadel (a. a. O.) überein, die nur bei sehr schnell verlaufenen Vergiftungen die Stoffe in den Geweben nachweisen konnten, nie aber bei langsam verlaufenen. Nach ihnen müssen die Veränderungen der Stoffe erst in den zweiten Wegen vor sich gehen, da die Verdauungsfermente und -säfte dieselben nicht anzugreifen vermögen.

Von den genannten Wirkungen der Digitalis ist die Blutdrucksteigerung die therapeutisch wichtigste. Dieselbe entlastet den venösen Kreislauf, steigert die Diurese, schafft hydropische Erscheinungen weg und dergl. mehr, was die venöse Stauung mit sich bringt. Es ist nicht meine Aufgabe auf diesen Stoff hier näher einzugehen.

Die Pulsverlangsamung wird von den Meisten, besonders den neueren Autoren, für irrelevant bezeichnet, aber mit Unrecht. Es kann doch nicht gleichgültig für den Herzmuskel sein, wenn derselberapid arbeitet, er muss doch auf diese Weise der Ermüdung rasch anheimfallen. Dreser (a. a. O.) und andere Autoren heben die Bedeutung hervor, welche die Verstärkung der Herzthätigkeit vereinigt mit der Pulsverlangsamung, namentlich aber mit der Verlängerung der Systole, für die Ausnutzung der Herzarbeit bei Herzklappenfehlern hat: bei defecten Klappen wird das Blut im Regurgitiren verhindert, bei verengerten Ostien wird durch die enge Oeffnung mehr Blut als sonst durchgetrieben.

Andererseits sind aber die Schwerlöslichkeit in Wasser und die schwere Resorbirbarkeit der reinen Digitalisbestandtheile, namentlich aber die locale und cumulative Wirkung, die Dorne, welche den Umgang mit der Digitalis so sehr hindern. Diese Eigenschaften bedingen auch das ewige Suchen nach einem brauchbaren Herzmittel.

Eine der allerletzten Arbeiten über Digitalis bereits vom Jahre 1892 gehört Robin ¹⁾. In einem längeren Artikel über

1) Robin, L'Union Médicale 1892. Nr. 10.

die Wirkung der Digitalis kommt R. zu folgenden Schlüssen

1) Die pulverisirte Droque reizt die Schleimhäute heftig — aus diesem Grunde darf man nur kleine Dosen des Pulvers geben und nicht etwa Pillen. 2) Die Digitalis wirkt cumulirend und wird sehr langsam ausgeschieden, woher man sie nicht lang fortgeben darf. 3) In kleinen Dosen verlangsamt sie den Puls in grossen — beschleunigt sie denselben. 4) Kleine Dosen erhöhen den Blutdruck, grosse — setzen denselben herab. Die Athembewegungen werden durch kleine Dosen beschleunigt durch grosse — vermindert. 5) Kleine Dosen vermindern die Ausscheidung des Stickstoffs oder in anderen Worten — sie vermindern die Zersetzung der Gewebe und zwar in so hohem Grade, dass die N-Ausscheidung von 26 auf 17 g fällt. Digitalis vermehrt die Diurese.

Wenn der Patient an Tachycardie leidet, muss Digitalis nach Robin mit Ergotin combinirt werden nach folgendem Rezept

Pulv. Digital.	0,6
Aq. destill.	180,0
Macera et adde	
Ergotini Bonjean	0,18
Kal. jodat.	5,6
Syrup.	26,0

Dieses ist im Laufe von 6 Tagen auszunehmen.

B. Eigene Untersuchungen.

I. Mit reinen Digitalisbestandtheilen.

Ich habe es für zweckmässig erachtet, ehe ich zur Untersuchung der Drogen schritt, die Wirkung der reinen wirksamen Digitalisbestandtheile kennen zu lernen, soweit eben letztere käuflich zu haben sind. Zu diesem Zweck habe ich mir geringe Quantitäten der von Merck in Darmstadt bezogenen Präparate angeschafft: Digitalin crystallis., Digitalein und Digitoxin. crystall.

An das Studium der Stoffe herangetreten, stiess ich gleich auf eine Schwierigkeit, — ausser Digitalein lösen sich die Stoffe

Wasser nicht. Alcohol als Lösungsmittel anzuwenden, konnte ich mich nicht entschliessen, da derselbe für den Organismus in einem Versuche doch nicht gleichgiltig ist. Ich habe es daher vorgezogen die in Wasser unlöslichen Stoffe in Substanz direct unter die Haut zu bringen oder aufs Herz zu streuen und zuletzt mit dem in Wasser löslichen Digitalein anzufangen.

A. Physiologische Versuche.

I. Digitalein.

1. Versuche an Kaltblütern.

Ueber die Wirkung auf das durch einen Fensterschnitt freigelegte Herz.

Die Thiere wurden zu diesen Versuchen auf ein Brettchen gebunden. Sodann wurde ein 3-eckiger Hautlappen über dem Sternum geschnitten und zurückgeklappt, das Sternum etwa zur Hälfte entfernt, der Herzbeutel vorsichtig eröffnet und das Herz freigelegt.

Es wurde stets abgewartet, bis die Zahl der Herzpulsationen constant geworden ist und erst dann die Injection gewöhnlich in den Lymphraum des linken Oberschenkels gemacht.

Zu allen Froschversuchen wurde *Rana temporaria* angewandt. Die Thiere wurden in einem wohl eingerichteten Aquarium gehalten und erwiesen sich stets ganz munter.

Versuch I.

Kleine *Temporaria* von 35 g.

h 38 m P = 34

» 39 m Injection von 1 mg Digitalein gelöst in 1 Ccm Aq. in den linken Oberschenkel.

h 40 m P = 33

11 h 46 m P = 28

» 41 m P = 30

» 47 m P = 29

» 42 m P = 29

» 48 m P = 30

» 43 m P = 30

» 50 m P = 30

» 44 m P = 31

» 55 m P = 32

» 45 m P = 30

In Bezug auf Athmung und Bewegungen der Glieder bis jetzt noch Alles normal.

11 h 57 m Da sich nichts geändert hat, so wurde noch 1 m Digitalein gelöst in 1 Ccm Aq. in den rechten Oberschenkel injicirt.

» 59 m $P = 32$

12 h 00 m $P = 33$

» 05 m $P = 35$

» 09 m $P = 37$

» 10 m Peristaltische Bewegungen der Herzkammer. Sonst noch Alles normal.

» 10 m Peristaltik, Arrhythmie und grosse Unregelmässigkeit der Herzbewegungen. Das Zählen der Herzschläge ist unmöglich geworden, da manche Schläge nicht vollkommen, dicot sind oder gar ausbleiben.

» 12 m $P = 20$ 12 h 17 m $P = 12$

» 15 m $P = 17$ » 19 m $P = 18$

Von 12 h ab bis jetzt ist sehr auffallend, dass auf leichten Druckbewegungen des Bauches das Herz diastolisch für eine Zeit stillsteht (Goltz'scher Klopfversuch)

12 h 21 m Die Systole, die bis jetzt nicht characteristisch war, wird jetzt deutlich länger als die Diastole.

» 22 m $P = 9$

» 23 m $P = 14$

» 24 m $P = 10$

» 25 m $P = 12$

Unterbrechung.

2 h 30 m $P = 10$ Peristaltik verschwunden. Athmung und Bewegung der Glieder schwach.

» 32 m $P = 13$

» 35 m $P = 11$

» 38 m $P = 17$

» 49 m $P = 9$ Athmung gruppenweise.

Unterbrechung.

4 h 00 m Zeitweiliger systolischer Herzstillstand.

» 30 m $P = 44$

7 h 00 m Tod. Herzkammer in Systole.

Anm. Im Laufe der Untersuchungen wurde öfters versucht das Herz vom Bauche aus zu beeinflussen und zwar auf zweierlei Weise: 1) durch leichtes Anklopfen des Bauches ohne denselben zu drücken — Goltz'scher Klopfversuch, — um durch Reizung des Bauchvagus einen diastolischen Herzstillstand hervorzurufen.

2) durch einen auf den Bauch ausgeübten Druck um auf diese Weise in das systolisch contrahirte Herz gewaltsam Blut einzupressen — Schmiedeberg'scher Versuch.

Versuch 2.

Kleine Temporaria von 47 g.

- h 3 m Injection von 4 mg Digitalein gelöst in 2 ccm Wasser in das linke und rechte Hinterbein à 2 mg in jedes. $P = 43$.
- 20 m $P = 44$
- 23 m $P = 45$
- 26 m $P = 41$
- 33 m $P = 29$. Peristaltische Bewegungen des Herzens. Athmung und Bewegung der Glieder normal. Der Goltz'sche Versuch ist von Effect — das Herz bleibt in Diastole still stehen.
- 1 h 50 m $P = 18$ } Die Diastole überwiegt zeitlich die
 » 56 m $P = 16$ } Systole.
 2 h 03 m $P = 20$ }
- » 16 m $P = 15$. Auf Goltz's Vers. heftige Reaction. Athmung und Bewegungen der Glieder gut.
- » 25 m $P = 19$. Die Systole dauert viel länger als die Diastole.
- » 28 m $P = 12$. Zeitweiser Stillstand der Kammer in Diastole. Die Systole dauert sonst immer viel länger als die Diastole.
- » 34 m $P = 15$. Systole immer länger. Auf Goltz's Vers. keine Reaction.
- 5 h 00 m Es ist keine weitere Veränderung eingetreten. Bewegungen der Glieder und Athmung normal. Der Goltz'sche Vers. gelingt nicht deutlich. Peristaltik nicht mehr vorhanden.
- » 14 m $P = 3$. Das Herz bleibt oft auf eine ganze Minute und zwar in Mittelstellung zwischen Systole und Diastole still stehen. Peristaltik nicht vorhanden.
- 6 h 30 m Das Herz stand 15 Minuten lang in Mittelstellung zwischen Systole und Diastole still, jetzt hat es wieder angefangen zu schlagen, blieb aber bald wieder in der erwähnten Stellung still stehen. Athmung geschieht gruppenweise. Bewegungen der Glieder normal. Bei Ausübung des Goltz'schen Klopversuches fing das Herz wieder an zu schlagen und zwar deutlich peristaltisch.
- 6 h. 45 m $P = 0$. Das Herz steht in Systole still. Bewegungen der Glieder und Athmung (gruppenweise) sind noch vorhanden.

Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glas-

glocke gesetzt. Den anderen Tag ist um 11 h 00 m der Frosch todt. Die Herzkammer in ausgesprochener Systole.

Versuch 3.

Kleine Temporaria von 42 g.

12 h 55 m P = 45.

1 h 10 m Injection von 1 mg Digitalein gelöst in 0,5 ccn Aq. in den rechten Oberschenkel.

» 14 m P = 42

» 22 m P = 43

» 25 m P = 43. Auf den Goltz'schen Vers. steht d. Herz in Diastole still.

» 32 m P = 40

» 37 m P = 45. Goltz's Vers. gelingt gut.

» 55 m P = 44

» 57 m P = 42. Peristaltik der Kammer. Athmung und Bewegungen der Glieder normal.

2 h 05 m P = 20. Peristaltik und Dikrotismus der Schläge

» 10 m P = 24. Status idem.

» 14 m P = 20. Goltz's Vers. gelingt gut. Athmung und Bewegungen der Glieder normal.

» 27 m P = 22

» 30 m P = 24. Peristaltik dauert fort. Diastole in 2 Absätzen. Goltz's Vers. gelingt eclatant.

Unterbrechung.

5 h 00 m Keine weitere Veränderungen.

6 h 25 m P = 6. In den Pulsationsintervallen befindet sich das Herz in Diastole. Athmung gruppenweise. Bewegungen der Glieder normal. Peristaltik seit 5 h nicht mehr vorhanden.

Unterbrechung.

Nächster Tag.

11 h 00 m Das Thier ist todt. Herzkammer in Systole.

Versuch 4.

Kleine Temporaria von 38 g.

11 h 58 m P = 47

12 h 00 m Injection von 10 mg Digitalein gelöst in 1 ccn Aq. in den linken Oberschenkel.

» 03 m P = 49

» 05 m Peristaltische Bewegungen der Herzkammer. Athmung und Bewegungen der Glieder und sonst Alles noch ganz normal. P = 45. Die Herzspitze ist permanent contrahirt und nur die Basis erweitert sich in der Diastole

- 2 h 07 m Stillstand der Kammer in ausgesprochener Systole, wobei die Vorhöfe sich noch contrahiren.
- » 10 m P der Vorhöfe = 36
- » 13 m P » » = 34
- » 15 m P » » = 37
- » 18 m P » » = 34
- » 20 m Zeitweiliger Stillstand der Vorhöfe in Diastole.
- » 22 m P der Vorh. = 34
- » 24 m Stillstand der Vorh. in Diastole. Athmung und Bewegungen der Glieder noch ganz normal. Das Thier wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Es bewegt sich ganz munter und normal bis auf das linke Hinterbein, welches gelähmt ist und nachgeschleppt wird.
- 4 h 22 m Das Thier ist todt. Herzkammer in ausgesprochener Systole.

Versuch 5.

Kleine Temporaria von etwa 38 g.

- 4 h 45 m P = 57
- » 46 m Injection von $\frac{1}{2}$ mg Digitalein Merck in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.
- » 49 m P = 60
- » 54 m P = 57
- » 59 m P = 58. Goltz's Vers. ohne Erfolg.
- 5 h 05 m P = 53. Goltz's Vers. ohne Effect. Systole länger und ausgesprochener.
- » 10 m P = 49
- » 15 m P = 42. Der Frosch verhält sich in jeder Beziehung normal.
- 5 h 20 m P = 49. Zeitweilige diastolische Stillstände von ganz kurzer Dauer. Auf Goltz 15 Sec. diastol. Stillstand. Andeutung von Peristaltik der Kammer.
- » 24 m Geringe Peristaltik der Kammer. P = 49.
- » 32 m P = 44. Energische Systole. Peristaltik kaum nennenswerth.
- » 35 m P = 44. Ausgiebige und kleine Diastole wechseln mit einander ab. Athmung und Bewegungen ganz normal.
- » 50 m P = 28 { Keine Peristaltik. Systole nicht energischer
- » 52 m P = 29 { als gewöhnlich.
- 6 h 10 m P = 30. Ausser der Pulsverlangsamung nichts Abnormes, nur die Vorhöfe sind in der Diastole ungewöhnlich stark gefüllt.
- » 37 m P = 26. Auf Goltz's Vers. 15 Sec. langer diastol. Stillstand, nachher ganz deutliche Peristaltik der Kammer.

6 h 40 m Peristaltik wieder geringer.

» 42 m Auf Goltz's Vers. 30 Sec. diastol. Stillstand und wieder stärkere Peristaltik. Athmung und Bewegungen der Glieder ganz normal.

» 45 m Massage des linken Oberschenkels.

» 48 m $P = 31$. Peristaltik dauert fort, aber nicht sehr ausgesprochen.

Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glasglocke gesetzt. Bewegt sich ganz gut. Beide Beine gleich gut beweglich. Folgender Tag.

11 h 14 m $P = 23$. Das Thier verhält sich in jeder Beziehung ganz normal.

» 20 m $P = 23$.

» 22 m $P = 25$.

Versuch 6.

Dasselbe Thier (vom Vers. 5).

11 h 55 m $P = 32$.

12 » 00 m Injection von 1 mg Digitalein in den linken Oberschenkel. Nach 8 Minuten Diastole ausgiebiger geworden. Nach 20 Min. Vorwiegen der Systole in Bezug auf Energie und Dauer derselben.

» 40 m $P = 18$. Peristaltik der Kammer.

Unterbrechung.

Am nächsten Tage wurde das Thier todt gefunden. Herzkammer in Systole, Vorhöfe schlaff.

Die Versuche 1, 2, 3, 4, 5 und 6 ergeben, in welcher Art und Weise das Digitalein die Herzthätigkeit des Frosches zu modificiren vermag.

1) Wie aus den Protocollen zu ersehen ist, bewirkt die Application von Digitalein am Frosch zunächst keine Verlangsamung des Herzschlages, letztere tritt erst in einem weiteren (peristaltischen) Stadium der Digitaleinwirkung ein. Umgekehrt gleich nach der Application des Giftes kann man oft gar eine Pulsbeschleunigung constatiren.

2) Diejenige Wirkung, die zunächst gewöhnlich am Herzen zum Vorschein kommt, ist eine Verlängerung und vergrößerte Ausgiebigkeit der diastolischen Phase, die in späterer

Stadien zuweilen sogar zu zeitweiligen kurzen diastolischen Stillständen sich steigern kann.

3) Indem die Diastole ebenso ausgiebig bleibt, wird dieselbe doch immer von kürzerer Dauer, wobei aber die Systole immer länger und energischer wird.

4) In einem gewissen Stadium der Digitaleinwirkung, das mit der Verlängerung der Diastole zusammenzufallen pflegt, ist bemerkenswerth, dass auf leichte Druckbewegungen des Bauches (Goltz'scher Klopffversuch) das Herz für eine relativ lange Zeit in Diastole still steht, was auf eine gesteigerte Reizbarkeit des Vagus wohl bezogen werden kann.

5) Bei nicht zu geringer Dosis folgt ein weiteres Stadium — der höchst unregelmässigen Herzthätigkeit namentlich während der Diastole: es tritt eine nach der Art der Darmperistaltik erfolgende Fortbewegung des Blutes von der Herzbasis zur Herzspitze ein; ferner erschlaffen manche Theile der Ventrikelwandungen nur wenig oder gar nicht, daher diese Einschnürungen und Vorstülpungen, die während der Diastole zu beobachten sind. Noch später zeigt der Herzventrikel überhaupt die Neigung mehr in contrahirtem Zustande zu verbleiben, die Vorhöfe füllen sich strotzend mit Blut und es gelingt ihnen ersichtlich nur sehr schwer (oft erst nach 2 oder mehr Contractionen, welche Erscheinung in diesen 6 Versuchen gerade nicht zu beobachten war) den Ventrikel zur Diastole zu bringen, die dann von peristaltischem Character ist.

Man kann fast mit Sicherheit annehmen, dass die Peristaltik auf diesem gegenseitigen Bestreben — des Ventrikels contrahirt zu bleiben und der Vorhöfe denselben zu dilatiren um den Inhalt hineinzupressen — beruht: den Vorhöfen gelingt es nur einen Theil des Inhaltes hineinzupressen, und dieser Theil wird nun von den aneinander gepresst zu sein sich bestrebenden Ventrikelwandungen bald in die eine, bald in die andere Ventrikeldecke geschleudert.

Dieses peristaltische Stadium kann je nach der angewandten Dosis rückgängig werden mit vollkommener Erholung des Thieres oder ein weiteres Stadium nach sich ziehen, nämlich

6) dauernden systolischen Ventrikelstillstand, der jedoch beim Frosch noch nicht Tod bedeutet. Der Frosch ist im Stande mit einem zu einem kleinem weissen Klümpchen zusammengeschrumpften Herzen ganz munter sich zu bewegen und umherzu hüpfen, als ob gar nichts geschehen wäre.

7) Erst nach einigen Stunden pflegt der Tod des Thieres einzutreten.

8) Bei entsprechender Dosis (Versuch 5) bemerkt man eine locale Einwirkung des Giftes, nämlich eine Lähmung derjenigen Extremität, in welche die Injection gemacht worden war.

9. Die minimalste Dosis des Merck'schen Digitaleins, die die Peristaltik noch hervorzurufen vermag, ist ein $\frac{1}{2}$ mg; dem dauernden Ventrikelstillstand und Tod — 1 mg.

b. Ueber die Wirkung auf das isolirte und am Williams'schen Apparate befestigte Herz.

Das Froschherz wurde in der von Williams¹⁾ angegebenen Weise präparirt und in den von Maki²⁾ modificirten Williams'schen Apparat eingebunden. Die Membranklappen waren durch die Glaskugelventile von M. Perles³⁾ ersetzt.

An dieser von Prof. Kobert⁴⁾ kürzlich abgebildeten und beschriebenen Modification des Williams'schen Apparates wurden alle meine Williams'schen Versuche angestellt.

1) Francis Williams, Ueber die Ursache der Blutdrucksteigerung bei der Digitalinwirkung. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XIII. 1881, p. 1.

2) Rioschiro Maki, Ueber den Einfluss des Camphers, Coffein und Alkohols auf das Herz. Inaug.-Diss. Strassburg. 1884.

3) Max Perles, Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Solanin und Solanidins. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XXVI. 1889. p. 9.

4) Kobert, R., Chemiker-Zeitung, Jahrgang 16., Nr. 39. p. 67 mit 4 Abbildungen.

Als Durchströmungsflüssigkeit diene ein Gemisch aus 60 Theilen defibrinirten Kalbsblutes und 40 Theilen physiologischer (0,75 pCtiger) Kochsalzlösung.

Mit dieser Flüssigkeit durchströmte ich das Herz zunächst 5 lange, bis die Pulsfrequenz und das Pulsvolumen constant geworden waren. Dann wurde Digitalein gelöst in physiologischer Na-Lösung zur Durchströmungsflüssigkeit hinzugesetzt, welche stets 50 ccm betrug.

In der nachstehenden Tabelle bedeuten *T* die Zeit, *P* die Anzahl der Herzschläge und *Q* die Quantität des gelieferten Blutes in Cubikcentimetern pro Minute.

Versuch 7.

Das Herz einer grossen *Rana temporaria* wird ausgeschnitten und am Williams'schen Apparate befestigt.

T		P	Q	Bemerkungen.
5 m.	5 h 9 m	39	4,0	Unvergiftete Blutflüssigkeit 50 ccm.
»	12 m	41	3,75	
»	14 m	44	4,5	
»	18 m	45	4,0	
»	20 m	44	4,0	
»	23 m	45	4,0	
»	27 m	47	4,5	
»	30 m	47	4,0	2 mg Scopolamin, hydrochl. zugesetzt.
»	33 m	47	3,5	
»	36 m	49	2,5	
»	40 m	48	3,0	
»	42 m	51	3,0	
»	44 m	51	3,0	
»	47 m	52	2,2	
»	55 m	52	2,75	4 mg Digitalein.
»	58 m	51	2,5	
6 h	»	50	2,5	
»	2 m	52	2,5	
6 h	5 m	49	2,5	
»	7 m	51	2,2	
»	9 m	52	4,0	
»	12 m	51	1,75	

T.		P.	Q.	Bemerkungen.
Nm.	6 h 14 m	51	1,5	
	» 20 m	48	1,5	
	» 24 m	46	1,5	
	» 40 m	16	1,0	
	» 44 m	3	0,5	
	» 48 m	16	1,0	
	» 52 m	8	1,0	
	» 55 m	15	1,0	
	7 h «	17	1,0	
	» 1 m	9	0,5	Die Herzpulse sind kaum noch wahrzunehmen. Nur die Mitte des Ventrikels dehnt sich in der Diastole aus, die Spitze bleibt contrahirt.
	» 3 m	5	0,25	
	» 5 m	8	0,5	
	» 7 m	7	0,5	
	» 9 m	6	0,5	
	» 11 m	8	0,25	
	» 15 m			Das Giftblut wird durch normales ersetzt
	» 35 m	22	2,0	
	» 37 m	23	2,0	
	» 39 m	23	1,5	
	» 40 m	23	3,0	
	» 42 m	22	2,0	Abbruch.

Ergebniss: Der Versuch ergab 1), dass die Verlangsamung der Herzschläge beim Durchströmen des Herzens mit durch Digitalein vergiftetem Blute (Concentration des Giftes im Blute = 1 : 12500) nicht nur auf Reizung des Vagus beruhen kann, denn letzterer wurde ja vor der Vergiftung des Blutes durch Digitalein durch das atropinartig wirkende Scopolamin gelähmt, was sich auch in der wenn auch unbedeutenden Beschleunigung der Herzschläge zeigte, die von 17 auf 52 pro Min. gestiegen sind. Der Versuch spricht also zu Gunsten Schmiedeberg's Theorie der rein musculären Wirkung der Digitalinstoffe auf Herz.

2) bei der Conc. 1 : 12500 erlahmte das Herz nicht vollständig, sondern nach dem Ersetzen des mit Digitalein vergifteten Blutes durch frisches Kalbsblut erwachte die Thätigkeit desselben wieder, — nachdem die Pulsation auf 8—6 sehr schwach

Schläge pro Min. gefallen war, stieg dieselbe jetzt mit einem Male auf 23 kräftige Schläge pro Min. an. Die Digitalinwirkung kann also, wie Heubel ¹⁾ zuerst nachgewiesen hat, am Froschherzen durch normales Blut weggespült werden.

3) Auch in diesem Falle haben wir gesehen, dass die Pulsverlangsamung nicht sofort nach Application des Giftes eintrat, sondern erst viel später — nach 45 Minuten.

4) Die jedenfalls zweifelhafte Steigerung der Pulsfrequenz nach Application des atropinartig wirkenden Scopolamins in unserem Versuche ist wohl geeignet die Annahme zu bestätigen, wonach beim Frosch kein beständiger Vagustonus existirt.

Im Versuche 5 haben wir gesehen, dass diejenige Extremität, in welche die Digitaleinjection gemacht worden war, sehr bald ihre electriche Erregbarkeit vollständig einbüsste, daher gehen wir zur Untersuchung der Einwirkung des Digitalins auf die isolirte Muskulatur über.

c. *Ueber die Wirkung des Digitaleins auf die isolirte Muskulatur.*

In allen Versuchen, wo electriche Reizung erforderlich war, wurde der Strom vom Bunsen'schen Zink-Kohle-Element mit Chromsäure gefüllt angewandt. Derselbe wurde vom Du Bois Reymond'schen Schlittenapparat inducirt. Die Distanz der Rollen von einander wird mit RA (= Rollenabstand) bezeichnet.

Versuch 8.

Kleine Temporaria von 25 g. Decapitirt, das Rückenmark ausgebohrt. Die Haut mit möglichster Schonung abgezogen. Die Hinterbeine mit den anhaftenden Muskeln werden an den Knieelenken vorsichtig abgeschnitten. Die rechte Extremität wird

1) Heubel, Pflüger's Archiv, Bd. 45. p. 470. 1889.

in eine Auflösung von 10 mg Digitalein in 10 ccm normaler Kochsalzlösung (0,75 %) gelegt; die Linke zur Controlle — blos in normale Kochsalzlösung. Beides geschieht zu gleicher Zeit und zwar um 5 h 30 m. Bei Prüfung mit dem electrischen Strom zucken beide Extremitäten gleich stark.

5 h 45 m: Zuckung in der vergifteten Extremität bei 280 mm RA; in der nicht vergifteten — bei 130 mm RA.

» 50 m: Z. in d. vergifteten Extrem. bei 280 mm, in d. nicht vergifteten — bei 130 mm.

« 55 m: Z. in d. vergifteten bei 280 mm, in d. nicht vergifteten — bei 130 mm.

6 h 05 m: Z. in d. vergifteten bei 170 mm, in d. nicht vergifteten — bei 130 mm.

» 20 m: Z. in beiden bei 160 mm.

» 25 m: Z. in d. vergifteten = 0 bei RA = 0; Z. in der nicht vergifteten — bei 130 mm.

Abbruch.

Ergebniss: 1) Das Digitalein steigerte zunächst die Erregbarkeit der Muskeln der vergifteten Extremität, um 2) bald nachher dieselbe ganz aufzuheben. 3) Die in normaler Kochsalzlösung gelegene Extremität änderte ihre Erregbarkeit während der ganzen Zeit des Versuches fast gar nicht.

Die Giftwirkung im gegebenen Falle kann sich erstrecken haben:

1) auf den Muskel,

2) auf den Nerven oder

3) auf beide zugleich. Welche Theile afficirt werden muss ein anderer Versuch entscheiden.

Versuch 9.

Kleine Temporaria von etwa 20—25 gr. Decapitirt, die Rückenmark ausgebohrt. Die Haut abgezogen. Die Hinterbeine mit den anhaftenden Muskeln werden an den Kniegelenken abgeschnitten und jedes in eine besondere Schale mit physiologischer ClNa-Lösung gelegt (um 12 h Mittags). Beide Hinterbeine erweisen sich bei der Prüfung durch den electrischen Strom gleich stark erregbar.

12 h 30 m wird zu jeder Schale je 10 gtt. Curare zugesetzt.

1 h 00 Beide Beine erweisen sich durch den electr. Strom gleich stark erregbar (bei einem Rollenabstande von 160 mm).

- h 4 m: in eine Schale wird 10 mg Digitalein gelöst in 1 ccm physiol. ClNa-Lösung hineingespült.
- » 10 m: Zuckung im mit Digitalein nicht vergifteten Beine (= A) bei 170 mm Rollenabstand; im mit Digitalein vergifteten (= B) — bei 100 mm.
- » 15 m: Zuckung im A bei 170 mm.
Zuckung im B bei 110 mm.
- » 25 m: Zuckung im A bei 140 mm.
Zuckung im B bei 100 mm.
- » 35 m: Zuckung im A bei 140 mm.
Zuckung im B bei 100 mm.
- » 45 m: Zuckung im A bei 150 mm.
Zuckung im B bei 100 mm.
- 2 h 00 m: Zuckung im A bei 150 mm.
Zuckung im B bei 80 mm.
- 2 h 15 m: Zuckung im A bei 150 mm.
Zuckung im B = 0 bei RA = 0
- 5 h 45 m: Zuckung im A bei 130 mm.
Zuckung im B = 0 bei RA = 0.

Ergebniss: 1) Da durch das Curare die Nervenendigungen gelähmt wurden, so können die nunmehr stattgehabten Veränderungen der Erregbarkeit nur in der Muskelsubstanz selbst ihren Grund haben, und zwar ist die Erregbarkeit im ausser Curare noch mit Digitalein vergifteten Beine sehr rasch ganz erloschen, während am curarisirten mit Digitalein nicht vergifteten Beine dieselbe stundenlang sich unverändert erhielt, folglich ist damit erwiesen, dass

2) das Digitalein die Muskelsubstanz selbst lähmt, während es die Erregbarkeit des Nerven, wie aus Versuch 8 zu schliessen, wenigstens zunächst, steigert. Denn am nicht curaresirten mit Digitalein vergifteten Beine stieg die Erregbarkeit sehr bald um ebenso bald zu erlöschen, während am curaresirten und 30 Min. nachher mit Digitalein vergifteten Beine die Erregbarkeit ohne vorher gestiegen zu sein bald erloschen war, d. h. der Nerv wird durch Digitalein wenigstens zunächst gereizt, der Muskel aber gelähmt. (Siehe Versuch 8)

Versuch 10.

Kleine Temporaria von 20—25 g. Decapitiert, das Rückenmark ausgebohrt. Die Hinterbeine werden abpräpariert, der Unterschenkel an den Kniegelenken abgeschnitten und jeder in eine besondere Schale mit 10 ccm. physiolog. ClNa-Lösung gelegt. Bei der Prüfung durch den electrischen Strom erweisen sich beide gleich stark erregbar, nämlich bei 180 mm RA.

- 11 h 30 m: In eine Schale wird 7 mg Digitalein gelöst in 0,7 ccm. physiol. ClNa-Lösung hineingespült.
- 35 m: Im mit Digitalein nicht vergifteten Beine (= A) Zuckung bei 180 mm RA. Im mit Digitalein vergifteten Beine (= B) Zuckung bei 180 mm RA.
- » 40 m: Zuckung im A bei 180 mm.
Zuckung im B bei 180 mm.
- » 45 m: Zuckung im A bei 180 mm.
Zuckung im B bei 190 mm.
- » 50 m: Zuckung im A bei 180 mm.
Zuckung im B bei 300 mm., wobei das Bein, auch ohne electrisch gereizt zu werden, von selbst zuckt.
- 12 h 00 m: Zuckung im A bei 180 mm.
Zuckung im B bei 170 mm.
- » 10 m: Zuckung im A bei 180 mm.
Zuckung im B bei 160 mm.
- » 20 m: Zuckung im A bei 170 mm.
Zuckung im B bei 170 mm.
- » 25 m: Zuckung im A bei 170 mm.
Zuckung im B bei 150 mm.
- » 40 m: Zuckung im A bei 160 mm.
Zuckung im B bei 150 mm.

Während der ganzen Zeit war die Erregbarkeit vom Nerven aus viel stärker als vom Muskel aus.

- 12 h 50 m: Zuckung im A bei 160 mm.
Zuckung im B = 0. Die Erregbarkeit ist auf gesunken sowohl vom Muskel selbst als auch vom Nerven aus.

Versuch 11.

- 1 h 20 m: Beide Oberschenkel desselben Frosches werden abpräpariert und jeder in eine besondere Schale mit physiolog. ClNa-Lösung gelegt. Beide erweisen sich gleich stark erregbar — bei 170 mm RA.
- » 25 m: Zu jeder Schale wird à 10 gtt. Curare hinzugesetzt.
- » 55 m: Zuckung beider Oberschenkel bei 180 mm.
Unterbrechung.

- h 10 m: Zuckung beider Oberschenkel bei 180 mm. Zu einer Schale wird 7 mg Digitalein gelöst in 0,7 ccm physiol. ClNa-Lösung hinzugesetzt.
- » 25 m: Zuckung im nur mit Curare vergifteten Oberschenkel (= C) bei 180 mm.
Zuckung im mit Curare und Digitalein vergifteten Oberschenkel (= CD) bei 100 mm.
- h 30 m: Zuckung im C bei 180 mm.
Zuckung im CD bei 100 mm.
- » 40 m: Zuckung im C bei 200 mm.
Zuckung im CD bei 100 mm.
- » 45 m: Zuckung im C bei 170 mm.
Zuckung im CD bei 70 mm.
- h 00 m: Zuckung im C bei 170 mm.
Zuckung im CD = 0 bei RA = 0.
- Ergebniss dasselbe wie das der Versuche 8 und 9.

Versuch 12.

Kleine Temporaria von 20—25 g.

- h 50 m: Decapitirt, das Rückenmark ausgebohrt. Die Hinterbeine abpräparirt und an den Kniegelenken abgeschnitten. Jedes Bein wird in eine besondere Schale mit 9,5 ccm physiolog. ClNa-Lösung gelegt. Beide erweisen sich bei der Prüfung durch den electr. Strom gleich stark erregbar — bei 180 mm RA.
- h 05 m: In eine Schale wird 1 mg Digitalein gelöst in 0,5 ccm physiol. ClNa-Lösung hineingespült.
- » 15 m: Zuckung im mit Digitalein nicht vergifteten Beine (= A) bei 160 mm.
bei 180 mm.
- » 35 m: Zuckung im A bei 160 mm.
Zuckung im mit Digitalein vergifteten Beine (= B)
Zuckung im B bei 180 mm.
- » 45 m: Zuckung im A bei 160 mm.
Zuckung im B bei 180 mm.
- » 55 m: Zuckung im A bei 160 mm.
Zuckung im B bei 180 mm.
- h 05 m: Zuckung im A bei 180 mm.
Zuckung im B bei 180 mm.
- » 15 m: Zuckung im A bei 180 mm.
Zuckung im B bei 180 mm.
- » 35 m: Zuckung im A bei 180 mm.
Zuckung im B bei 180 mm.
- » 55 m: Zuckung im A bei 180 mm.
Zuckung im B bei 140 mm. Unterbrechung.

- 4 h 25 m: Zuckung im A bei 180 mm.
 Zuckung im B bei 120 mm.
 » 40 m: Zuckung im A bei 180 mm.
 Zuckung im B bei 150 mm.
 » 50 m: Zuckung im A bei 180 mm.
 Zuckung im B bei 150 mm.
 5 h 15 m: Zuckung im A bei 180 mm.
 Zuckung im B bei 180 mm.
 » 35 m: Zuckung im A bei 180 mm.
 Zuckung im B bei 130 mm.
 » 50 m: Zuckung im A bei 180 mm.
 Zuckung im B bei 110 mm.
 6 h 15 m: Zuckung im A bei 180 mm.
 Zuckung im B bei 110 mm. Unterbrechung.

Am folgenden Tage.

- 10 h 20 m: Zuckung im A bei 180 mm.
 Zuckung im B auch bei grösster Stromstärke (vollkommener Uebereinanderschlebung der Rollen) kaum zu merken und nur an den Enden der Extremitäten.

Die Muskulatur der nicht vergifteten Extremität (A) behielt ihre normale Farbe und Durchsichtigkeit bei, während die vergiftete (B) blass und undurchsichtig trübe erscheint. Bei der mikroskopischen Untersuchung eines frischen Zupfpräparates erwies sich A ganz normal, insofern als die Querstreifung der Muskulatur ganz deutlich und hübsch hervortrat. Die Muskulatur B erwies sich verändert, die Querstreifung verschwamm zum grössten Theile und war nur stellenweise zu merken.

Ergebniss: Der Versuch zeigt: 1) dass selbst eine starke Verdünnung des Digitaleins wie 1 : 10.000 noch den Muskel verhältnissmässig rasch lähmt, wenn auch langsamer als die grösseren Dosen der vorausgegangenen Versuche (8, 9, 10 und 11).

2) dass eine solche Verdünnung noch im Stande ist selbst anatomische Veränderungen hervorzurufen.

3) dass die charakteristischen Wirkungen des Digitaleins auf den Muskel — zunächst Steigerung und darauf Aufhebung der Erregbarkeit auch bei dieser Verdünnung hervortreten.

Versuch 13.

Kleine Temporaria von etwa 30 g.

- 1 h 15 m: Decapitirt, das Rückenmark ausgebohrt. Die Hinterbeine abpräparirt und an den Kniegelenken abgeschnitten. Jedes wird in eine besondere Scha

mit 9,75 cem physiolog. ClNa-Lösung gelegt. Bei der Prüfung durch den electr. Strom erweisen sich beide gleich stark erregbar bei 180 mm RA.

h 35 m: Zu einer Schale wird 0,5 mg Digitalein gelöst in 0,25 cem physiol. ClNa-Lösung hinzugesetzt.

Z im mit Digitalein nicht vergifteten Beine (= A) bei 200; Z im mit Digitalein vergifteten Beine (= B) ebenfalls bei 200. Dieses Bein scheint etwas empfindlicher zu sein — es zuckte einmal schon bei 250 mm RA.

4 h 30 m: Z im A bei 150	5 h 35 m: Z im A bei 160
Z im B bei 150	Z im B bei 160
» 45 m: Z im A bei 160	» 50 m: Z im A bei 160
Z im B bei 160	Z im B bei 160
5 h 00 m: Z im A bei 160	6 h 10 m: Z im A bei 160
Z im B bei 160	Z im B bei 160
» 15 m: Z im A bei 160	» 30 m: Z im A bei 160
Z im B bei 150	Z im B bei 160

Unterbrechung. — Am folgenden Tage:

0 h 30 m: Z im A bei 160

Z im B = 0 bei R A = 0. Farbe und Durchsichtigkeit unverändert.

» 50 m: Um zu prüfen, ob nicht die Erregbarkeit im B nur für Electricität verschwunden ist, wird zu beiden Schalen à 4 gtt. Guanidinlösung (Guanidinum hydrochl. 20 mg: 1 cem Aq.) hinzugesetzt. Guanidin ist ein Nervengift¹⁾ — es tödtet den Nerven und reizt direct den Muskel, wenn letzterer überhaupt noch reizbar (lebendig) ist.

1 h 00 m: Spontane Zuckung der Phalangen von A.

Spontane Zuckung im B = 0.

1 h 15 m: Idem.

1 h 30 m: Idem.

12 h 00 m: Spontane Zuckung im A = 0; die electr. Erregbarkeit blieb dabei bestehen.

Spontane Zuckung im B = 0.

Ergebniss: Der Versuch zeigt: 1) dass auch bei einer Verdünnung von 1 zu 20,000 das Digitalein seine muskeltödtende Wirkung immer noch entfaltet, wenn auch langsamer;

2) dass auch bei dieser Verdünnung die anfängliche Steigerung der Erregbarkeit des Nerven nicht auszubleiben scheint;

1) A. Jordan, Ueber die Wirkung zweier Derivate des Guanidins. Diss. Dorpat, 1892.

3) dass das Digitalein den Muskel nicht etwa nur für electrische Reize unerregbar, sondern überhaupt unerregbar macht, folglich ganz tödtet (bewiesen durch Guanidin);

4) dass bei dieser Verdünnung grobe anatom. Veränderungen der Muskelsubstanz, wie Veränderung der Farbe und der Durchsichtigkeit, nicht stattzufinden scheinen.

Versuche an Warmblütern.

a. Wirkung auf das Herz.

Versuch 14.

Mittelgrosse Katze.

5 h — m P = 198 pro Min.

» 15 m Subcut. Injection von 1 mg Digitalein gelöst in 0,5 ccm Wasser.

» 35 m P = 140, ausserordentlich kräftiger Schlag, unvergleichlich kräftiger als vor der Injection.

6 h — m P = 160. Der Schlag ist schwächer.

» 25 m P = 172. Schlag schwächer.

Ergebniss: Die Wirkungen, die 1 mg Digitalein auf die Katze ausgeübt haben, sind folgende:

1. Starke Vergrösserung der Herzenergie, erkennbar an sehr starken Herzschlägen;

2. Verlangsamung des Pulses;

3. ist die überhaupt sehr rasch eintretende Wirkung des Digitaleins zu verzeichnen.

Versuch 15.

Katze vom Versuche 14.

11 h — m P = 196 pro Min.

» 10 m Subcutane Injection von 5 mg Digitalein gelöst in 0,5 ccm Wasser.

» 20 m Das Thier ist sehr unruhig und lässt sich nicht untersuchen.

» 45 m P = 236. Die Schläge sind etwas kräftiger als vor der Injection. Das Thier scheint Geschmacksempfindungen zu haben.

12 h — m P = 236. Schlag weniger kräftig. Das Thier scheint Geschmacksempfindungen zu haben.

Ergebniss: 1) Die rasch eingetretene Pulsbeschleunigung lag auf einer bei 5 mg Digitalein directen Lähmung des Vagus, ohne vorhergegangene Reizung desselben, beruhen.

2) Die Geschmacksempfindungen sind vielleicht ein Ausdruck der Wirkung des Digitaleins auf den Verdauungstractus, auch wenn das Gift subcutan applicirt worden war.

Im Grossen und Ganzen ist an Warmblütern äusserlich, d. h. ohne Blutdruckmessungen, bei Application von Digitalein wenig zu sehen.

b. Wirkung auf die Gefässe.

Ueber die Wirkung der Digitalinstoffe auf die peripheren Gefässe existiren so viele und diametral entgegengesetzte Angaben in der Litteratur, dass ich, mich einmal mit diesen Stoffen beschäftigend, es nicht unterlassen will, von der Wirkung der Stoffe an einigen Versuchen mich zu überzeugen, zumal im hiesigen pharmakologischen Institute von H. Thomson unter Prof. K o b e r t eine grosse Anzahl solcher Versuche ausgeführt worden ist namentlich auch mit Digitalein.

Versuch 16.

Durchströmungsversuch.

Es soll eine sogen. «überlebende» Niere künstlich mit Blut desselben Thieres durchströmt werden. Dazu wird, sofort nach dem Schlachten eines Rindes, die Niere herauspräparirt, wobei die grossen Gefässe etwas entfernt von der Einmündung in das Organ durchschnitten werden. Seit der Entnehmung des Organs und des Blutes dem Rinde bis zur Anstellung des Versuches vergeht nicht mehr als eine $\frac{1}{2}$ Stunde. Das Organ und das defibrinirte Blut werden in den «Durchströmungsapparat» gebracht, wo eine constante T° von 37° R herrscht. Das Blut durchströmt das Organ unter einem ad libidum regulirbaren Drucke. Weiter ist die Einrichtung getroffen, dass bald normales, bald vergiftetes Blut unter demselben Drucke durch das Organ durchgelassen werden kann und ohne dass dabei eine Stockung des Stromes zu Stande kommt. Näheres darüber bei

K o b e r t ¹⁾ und T h o m s o n ²⁾. Das Gift wird nicht eher appli-
cirt, als bis die Durchströmungsgeschwindigkeit constant gewor-
den ist.

T.		Q.		Bemerkungen.
3 h	37 m —	120 + 30	= 150 ccm.	Druck = 50 mm Hg
»	38 m —	50 + 80	= 130 ccm.	
»	39 m —	120	= 70 ccm.	
»	40 m —	55 + 30	= 85 ccm.	
»	41 m —	142	= 87 ccm.	
»	42 m —	22	= 70 ccm.	
»	43 m —	100	= 78 ccm.	
»	44 m —	20 + 50	= 70 ccm.	1 mg Digitalein : 100 ccm Blut.
»	45 m —	20—70	= 50 ccm.	Normal.
»	46 m —	118	= 48 ccm.	
»	47 m —	162	= 44 ccm.	
»	48 m —	10	= 48 ccm.	
»	49 m —	56	= 46 ccm.	
»	50 m —	98	= 42 ccm.	
»	51 m —	138	= 40 ccm.	
»	52 m —	138 + 42	= 42 ccm.	
»	53 m —	72—30	= 42 ccm.	Dasselbe Gift 1 mg
»	54 m —	104	= 32 ccm.	100 ccm Blut.
»	55 m —	126	= 22 ccm.	Normal.
»	56 m —	142	= 16 ccm.	
»	57 m —	170	= 28 ccm.	
»	58 m —	200	= 30 ccm.	
»	59 m —	32	= 32 ccm.	
4 h	00 m —	68	= 36 ccm.	
»	1 m —	102	= 34 ccm.	
»	2 m —	134	= 32 ccm.	10 mg Digitalein au 150 ccm Blut.
»	3 m —	150	= 16 ccm.	Normal.
»	4 m —	26	= 26 ccm.	
»	5 m —	38	= 12 ccm.	
»	6 m —	54	= 16 ccm.	
»	7 m —	70	= 16 ccm.	
»	8 m —	104	= 34 ccm.	Druck gesteigert.
»	9 m —	154	= 50 ccm.	

1) K o b e r t, R., Ueber die Beeinflussung der peripheren Gefä-
durch pharmakologische Agentien, Arch. f. exp. Pathol. und Pharmacol. Bd. 2

2) T h o m s o n, H., Diss. unter demselben Titel. Dorpat, 1886.

T.		Q.		Bemerkungen.
4 h	10 m — 208 — 154	=	54 ccm.	Druck allmählig bis auf 70 mm Hg gesteigert.
	11 m — 60	=	52 ccm.	
	12 m — 110	=	50 ccm.	
	13 m — 60	=	50 ccm.	
	14 m — 60	=	50 ccm.	
	15 m — 105	=	45 ccm.	
	16 m — 45	=	40 ccm.	Dasselbe Gift 10 mg : 150 ccm Blut.
2	17 m — 20	=	20 ccm.	Normal.
3	18 m — 44	=	24 ccm.	
2	19 m — 68	=	24 ccm.	
2	20 m — 94	=	26 ccm.	
2	21 m — 120	=	26 ccm.	
2	22 m — 150	=	30 ccm.	
2	23 m — 180	=	30 ccm.	
2	24 m — 30	=	30 ccm.	
2	25 m — 60	=	30 ccm.	
2	26 m — 94	=	34 ccm.	
2	27 m — 130	=	36 ccm.	
2	28 m — 14 + 20	=	34 ccm.	
2	29 m — 70	=	36 ccm.	
2	30 m — 90	=	20 ccm.	
2	31 m — 110	=	20 ccm.	
2	32 m — 126	=	16 ccm.	
2	33 m — 146	=	20 ccm.	
2	34 m — 164	=	18 ccm.	
2	35 m — 184	=	20 ccm.	
2	36 m — 20	=	20 ccm.	
2	37 m — 40	=	20 ccm.	
2	38 m — 60	=	20 ccm.	
2	39 m — 82	=	22 ccm.	
2	40 m — 110	=	28 ccm.	
2	41 m — 134	=	24 ccm.	
2	42 m — 14	=	30 ccm.	
2	43 m — 42	=	28 ccm.	Abbruch.

Ergebnisse: Das Digitalin wirkt also sowohl bei der Concentration 1 : 10 000 als auch bei der Concentration 1 : 100 000 auf die Nierengefäße in der ersten Minute zunächst nicht auffallend verändernd ein, bald darauf aber deutlich verengernd selbst wenn die Einwirkung nur 1 oder höchstens 2 Minuten gedauert hatte. Robert und Thomson fanden fast stets sogar

eine anfängliche Erweiterung, auf die erst eine Verengerung der Gefäße folgte. Vielleicht ist aber die anfängliche Unbeeinflussung des Strombettes in meinem Versuche eben im Sinne einer Erweiterung nach Kobert und Thomson zu deuten. Eine secundäre Verengerung der Gefäße durch Digitalein ist aber aus meinem Versuche zweifelsohne zu folgern.

2. Digitalin.

Durch Husemann und andere Autoren ist nachgewiesen, dass Digitalin und Digitoxin, auch wenn sie in Form scheinbar ganz unlöslicher Körnchen unter die Haut gebracht werden, dennoch sich in der Lympheflüssigkeit lösen und eine spezifische Wirkung entfalten.

Versuch 17.

Ganz kleine Temporaria von etwa 25 g.

- 1 h 10 m P = 32
- » 20 m Ein Körnchen Digitalinum crystallis. Merck wird unter die Haut des linken Oberschenkels gebracht.
- » 26 m P = 24
- » 32 m P = 33
- » 35 m P = 35. Ein Körnchen auf das Herz gestreut.
- » 43 m P = 29
- » 46 m P = 27
- » 51 m P = 24
- 1 h 58 m P = 28. Eine Messerspitze Digitalin auf das Herz und dessen Umgebung gestreut.
- 2 h 02 m P = 27
- » 12 m P = 26
- » 25 m P = 25
- » 45 m P = 24
- 3 h 13 m P = 15. Athmung und Bewegungen der Glieder bis jetzt normal.
- 5 h 15 m P = 23
- » 20 m P = 22. Abbruch.

Ergebniss: Das Präparat hat also fast gar keine Wirkung ausgeübt und wird, zumal von der Substanz relativ viel verabfolgt wurde, vom echten Digitalin sehr wenig enthalten.

3. Digitoxin.

Versuch 18.

Mittelgrosse Temporaria von etwa 30 g.

- 1 h 11 m P = 29
» 25 m Ein Körnchen von Digitoxinum crystallisatum Merck wird unter die Haut des linken Hinterbeines gebracht.
» 27 m P = 33
» 30 m P = 32
» 34 m P = 33
» 37 m P = 32
» 40 m Da keine Reaction eingetreten ist, so wird ein Körnchen Digitoxin aufs Herz gebracht.
» 45 m P = 26
» 47 m P = 24
» 50 m P = 21
» 52 m P = 20
» 56 m P = 15. Verlängerung der diastolischen Phase.
1 h 59 m P = 12.
2 h 5 m P = 5. Die Diastole ist ausserordentlich langdauernd. Die Herzspitze ist contrahirt und theilhaftig sich an der Herzaction nicht. Athmung und Bewegungen normal.
» 10 m P = 17.
» 17 m Zeitweiliger Stillstand des Herzens und der Vorhöfe.
» 19 m P = 6.
» 24 m P = 7.
» 40 m P = 5.
» 50 m Das Herz und die Vorhöfe stehen in Systole still. Der Goltz'sche Klopversuch ist ohne Erfolg. Auf den Schmiedeberg'schen Versuch macht das Herz noch ein Paar schwache Contractionen und bleibt wiederum in Systole stehen. Athmung und Bewegungen der Glieder normal.
3 h 00 m Dauernder Herz- und Vorhofstillstand. Athmung und Bewegungen normal. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Er hüpfet unter derselben umher, als ob gar nichts geschehen.
5 h 15 m Der Frosch ist todt. Herzkammer systolisch contrahirt.

Ergebniss: Der Versuch zeigt:

1) dass das Digitoxin alle für Kaltblüter charakteristischen Digitalinwirkungen hervorruft.

2) dass das sonst in H_2O unlösliche Digitoxin von den Körpersäften gelöst und resorbirt wird und zwar ziemlich prompt.

Schlüsse: Von den drei von Merck bezogenen Substanzen haben sich also das Digitalein und Digitoxin als charakteristisch wirkend erwiesen, während das Digitalin keine typische Wirkung entfaltete.

B. Versuche über die Lösbarkeit des Digitalins und Digitoxins.

Es ist eine bis jetzt nicht genügend untersuchte Frage, ob die beiden in H_2O unlöslichen Stoffe, Digitalin und Digitoxin, in den so häufig verordneten Digitalisinfusen überhaupt mitenthalten sind oder nicht. Der eben angeführte Versuch zeigt, dass in eiweisshaltigen Körperflüssigkeiten das Digitoxin sich doch löst. Ich versuchte nun festzustellen, ob sich eine Löslichkeit desselben auch in anderen Eiweissflüssigkeiten sowie in Digitonin und Digitalein werde darthun lassen.

Versuch 19.

Eine ziemlich concentrirte wässrige Lösung von Digitonin (von Schmiedeberg dargestellt) wird in 2 Reagenzgläsern gleich vertheilt. In ein Reagenzglas wird eine kleine Messerspitze Digitalin. cryst. Merck hineingethan. Letzteres löst sich rasch und klar auf. In das zweite Reagenzglas wird eine ebenso grosse Menge Digitoxin. cryst. Merck hineingethan. Dasselbe scheint sich nicht zu lösen, auch beim Kochen nicht. Beide Reagenzgläser werden verschlossen stehen gelassen.

Am folgenden Tage wird der Inhalt des 2. Reagenzglases, das Digitonin-Digitoxin, aufs Filter gebracht, und das nunmehr klare Filtrat zum Versuch angewandt.

Hierzu ist die Vorbemerkung nach Prof. Kobert nothwendig, dass das Schmiedeberg'sche Digitonin nur äusserst schwache Giftwirkungen besitzt, die ausserdem das Bild der Digitoxinvergiftung gar nicht stören.

Eine kleine Temporaria wird auf den Rücken aufgebunden. Fensterschnitt, Herz vorgestülpt aus dem eröffneten Herzbeutel.

10 h 30 m P = 39.

» 40 m P = 35.

» 42 m P = 35.

» 47 m Injection von 1 ccm Digitonin-Digitoxinfiltrat unter die Haut des linken Oberschenkels

- 10 h 55 m Systole viel energischer und länger.
 11 h 00 m $P = 21$.
 » 20 m Systole überwiegend, ausserordentlich energisch und langdauernd. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt.
 12 h 13 m $P = 18$. Diastole sehr unausgiebig und sehr kurzdauernd, Systole sehr langdauernd und energisch. Athmung und Bewegungen normal.
 11 h 08 m $P = 18$.
 » 50 m $P = 18$. Peristaltik der Herzkammer. Ausgesprochene Systole, sehr geringe Diastole. Linkes Bein gelähmt. Athmung schwächer.
 Unterbrechung.
 15 h 30 m Der Frosch ist todt, Herzspitze in Systole, blass. Herzbasis schlaff.

Also sind das Digitoxin wie das Digitalin Merck in Wasser bei Gegenwart von Digitonin löslich. Das auf diese Weise gelöste Digitoxin entfaltet die charakteristischen Wirkungen.

Versuch 20.

1. Zu einer wässrigen Lösung von Digitalein, Concentration 1:1000, wird eine kleine Messerspitze Digitalin, cryst. Merck hinzugethan und geschüttelt. Das Digitalin löst sich in der Kälte nicht, wohl aber beim Erwärmen, wobei nach dem Erkalten der Lösung keine Trübung entsteht. In einer ebenso grossen Quantität destillirten Wassers löst sich eine Messerspitze Digitalin ebenfalls beim Erwärmen, fällt aber beim Erkalten der Lösung wieder aus.

2. Eine wässrige Lösung von Digitalein Merck von der Concentration 1:1000 wird in 2 Reagenzgläsern gleich vertheilt. Zu einem Reagenzgläschen wird eine Messerspitze Digitoxin, cryst. Merck zugesetzt; der Inhalt wird gekocht und nachher abfiltrirt. Die während des Kochens verdampfte Flüssigkeitsmenge wird durch eine entsprechende Quantität destillirten Wassers ersetzt.

Nun wird einem Frosch von einem Reagenzglase eine Spritze injicirt, einem anderen Frosch vom anderen Reagenzglase eine Spritze. Sollte sich Digitoxin wenigstens spurweise in der Digitaleinlösung gelöst haben, so müsste die Wirkung am be-

treffenden Frosche viel früher eintreten. In der That belief sich aber der Unterschied nur auf wenige Minuten zu Gunsten des Digitoxins.

Die Gegenwart des Digitaleins wird demnach kaum einen erheblicheren Einfluss auf die Löslichkeit des Digitoxins haben.

Versuch 21.

Eine 1 %ige Auflösung von Hühnereiweiss in 0,6 %iger ClNa-Lösung wird mit einer unbestimmten kleinen Menge Digitoxin. cryst. Merck in der Reibschale verrieben, dann in einem Reagenzglase geschüttelt und einige Zeit stehen gelassen. Die abgestandene Flüssigkeit wird aufs Filter gebracht und das klare Filtrat zum nun folgenden Versuch verwendet.

Kleine Temporaria. Fensterschnitt, Herz vorgestülpt aus dem eröffneten Herzbeutel.

12 h 35 m P = 49

» 42 m P = 52

» 44 m P = 51

» 48 m Injection von 1 ccm des oben erwähnten Filtrates in den linken Oberschenkel.

» 49 m P = 52

» 51 m P = 50

» 53 m P = 52

» 55 m P = 47. Systole viel energischer und länger dauernd

» 57 m P = 48

» 59 m P = 47

1 h 00 m P = 47

» 02 m P = 44

» 03 m P = 46. Peristaltik des Ventrikels.

» 30 m Systol. Stillstand des Ventr. Die Vorhöfe schlagen noch schwach.

Der Versuch ist beendet.

Wir ersehen aus demselben, dass Digitoxin in Gegenwart von Hühnereiweiss in H_2O löslich ist. Hier sind folgende Möglichkeiten denkbar: 1) entweder ist bloss die Gegenwart von Eiweiss zur Lösung des Digitoxins in H_2O erforderlich, oder 2) das Digitoxin geht mit dem Eiweiss eine in H_2O lösliche Verbindung ein, oder schliesslich 3) beides geschieht zugleich. Um darüber Aufklärung zu gewinnen wird der folgende Versuch vorgenommen.

Versuch 22.

Kleine Temporaia.

Aufgebunden auf den Rücken. Fensterschnitt. Herz vorge-
 stülpt aus dem eröffneten Herzbeutel. Eine 1 %ige Eiweiss-
 auflösung in physiolog. ClNa-Lösung wird mit Digitoxin.
 cryst. Merck in der Reibschale verrieben, dann lange umge-
 rührt, filtrirt, das Filtrat gekocht, die Abkochung wieder filtrirt
 und dieses Filtrat nun angewandt.

10 h 34 m P = 44

» 36 m P = 42

» 38 m P = 40

» 39 m P = 40

» 42 m Injection von 1 ccm des oben erwähnten Filtrates
 in den linken Oberschenkel.

» 49 m P = 38. Systole energischer.

» 57 m P = 24. Systole ausserordentlich energisch und lang-
 dauernd. Die Klammer wird während der Systole
 ganz blutleer.

1 h 00 m P = 29

» 05 m P = 25

» 12 m P = 24 Die Systole überwiegt bedeutend an Energie
 und Dauer die Diastole, welche sehr unausgiebig ist.

1 h 30 m P = 22

» 45 m Andeutung von Peristaltik.

» 57 m Ganz deutliche Peristaltik.

Unterbrechung.

Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt.

Bewegt sich wenig.

5 h 12 m P = 29. Diastole etwas ausgiebiger geworden. Der
 Frosch scheint sich einwenig erholt zu haben. Ath-
 mung und Bewegungen ordentlich. Linkes Bein
 gelähmt.

6 h 50 m Das Herz hat sich noch mehr erholt. Bewegungen
 schwächer. Unterbrechung.

Am folgenden Tage wird der Frosch todt gefunden. Herz-
 kammer in systol. Contraction, besonders ausgesprochen an der
 Herzspitze.

Versuch 23.

Kleine Temporaia.

Aufgebunden auf den Rücken. Fensterschnitt, Herz vor-
 gestülpt aus dem eröffneten Herzbeutel.

Eine 1 %ige Eiweissauflösung in physiolog. ClNa-
 Lösung wird mit Digitoxin. cryst. Merck in d. Reibschale
 verrieben, dann lange umgerührt, filtrirt, das Filtrat gekocht, die

Abkochung wieder filtrirt und der Rückstand auf dem Filter nun angewandt.

12 h 20 m P = 36

» 30 m P = 40

» 33 m P = 41

» 45 m Application des oben erwähnten Filtrerrückstandes unter die Haut des linken Oberschenkels.

1 h 07 m P = 42

» 18 m P = 43. Systole energischer.

» 39 m P = 44. Andeutung von Peristaltik.

» 46 m P = 45

» 54 m P = 43. Starke Peristaltik der Kammer.

2 h 23 m P = 39. Die Herzspitze wird während jeder Systole blasenartig aufgetrieben. Athmung und Beugungen normal, auch die des linken Beines normal.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt. Bewegt sich normal.

5 h 12 m Wieder auf den Rücken aufgebunden.

» 22 m P = 28. Systole sehr energisch, während derselben wird die Herzspitze blasenartig aufgetrieben.

6 h 32 m P = 28. Die Herzspitze dauernd blasenartig abgegeschnürt. Systole sehr kräftig.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Die Bewegungen sind nicht ausgiebig. Beide Beine gleich stark beweglich.

Am folgenden Tage um

10 h 50 m ist der Frosch todt. Herzkammer in systolischer Contraction.

Versuche 22 und 23 ergeben, dass das Digitoxin sowohl bloss in Gegenwart von Eiweiss als auch vielmehr noch in Verbindung mit letzterem in H_2O löslich ist. Es bleibt natürlich noch nachzuweisen übrig, ob jeder Art Eiweiss, ob z. B. Blutserum ebenso sich zu Digitoxin verhält wie Hühnereiweiss. Dazu folgender Versuch.

Versuch 24.

Kleine Temporaria.

Aufgebunden auf den Rücken. Fensterschnitt. Herz vorgestülpt aus dem eröffneten Herzbeutel. Es wird mit Katzenblutserum und Digitoxin in bekannter Weise ein Filtrat gewonnen. Dasselbe ist aber trübe und bleibt so auch nach mehrfachem Filtriren. Das Serum allein filtrirt klar.

12 h 24 m P = 44.

- 2 h 32 m Injection von 1 cem Blutserumdigitoxin in den linken Oberschenkel.
- » 34 m $P = 50$. Systole viel energischer. Die Herzkammer wird in der Systole ganz blass.
- » 36 m $P = 49$
- » 39 m Auf den Goltz'schen Versuch langer diastolischer Stillstand.
- 42 m $P = 36$. Peristaltik des Ventrikels. Systole ausserordentlich energisch und langdauernd.
- 45 m Ausserordentlich heftige peristaltische Bewegungen. Abschluss des Versuches.

Ergebniss: Das Blutserumeiweiss geht augenscheinlich mit dem Digitoxin eine Verbindung ein, die in H_2O löslich sein muss, denn wie soll man anders die Thatsache deuten, dass das mehrfach filtrirte Blutserumdigitoxin dem Frosch injicirt so prompt die charakteristische Wirkung hervorruft? Warum die Trübung, können wir nicht entscheiden. Der Versuch wurde mehrfach wiederholt mit sehr frischem klarem Serum und doch wurde jedes Mal ein trübes Filtrat gewonnen. Wir müssen also das Durchsichtigwerden des Blutserums als eine chemische Wirkung des Digitoxins auffassen; die Digitoxinserumverbindung ist offenbar in H_2O nicht klar löslich.

Die Versuche 19, 20, 21, 22, 23 und 24 ergeben, dass Digitonin, Eiweiss, weniger Digitalein, indem sie in H_2O mit Digitoxin zusammengebracht werden, auf letzteres dahin einwirken, dass sie es in H_2O löslich machen. Was das Digitalin betrifft, so können wir uns in Bezug auf dasselbe nicht mit Bestimmtheit aussprechen, da wir kein reines Präparat vor uns haben *).

II. Versuche mit Digitalisspecies.

Um die noch nicht untersuchten Digitalisspecies mit der wohl bekannten Digitalis purpurea vergleichen zu können schicke ich einige Versuche über die letztere voraus.

*. Als vorliegende Arbeit bereits im Drucke war ging Prof. Kobert die Nachricht zu, dass Prof. Kiliani in München soeben mit einer chemischen Fabrik sich in Verbindung gesetzt hat um chemisch reines Digitalin in den Handel bringen zu lassen.

Was die botanisch-pharmokognostische Seite der von mir untersuchten Drogen betrifft, so musste ich leider dieselbe fast unberührt lassen, da ich in der mir zu Gebote stehenden Literatur fast nichts habe ermitteln können und nur von 2 Arten habe ich bei de Candolle kurze Mittheilungen gefunden. Diejenigen Quellen, wo möglicherweise näherer Aufschluss über die Drogen zu finden wäre, nämlich Lindley¹⁾, Bauer²⁾, Bruynwisch³⁾ habe ich leider nicht zu Gesicht bekommen können.

Da ich die Versuche mit den Drogen in derselben Art und Weise anstellte, wie die mit den reinen Digitalisbestandtheilen der Digitalis pp. und da die am Frosch zu beobachtenden Erscheinungen im Allgemeinen hier wie da dieselben sind, so bevorzugte ich es Raumersparnisses wegen einige Protocolle nur im extenso anzuführen.

Wie ich bereits am Anfange bemerkt habe, arbeitete ich nur mit Infusen der Drogen. Dieselben wurden folgendermaassen hergestellt: die Drogue (Blätter, Samen, Samenkapseln, Stengel) wurde in der Reibschale zu einem groben Pulver verrieben. Letzteres wurde mit aq. destill. resp. mit physiol. ClNa-Lösung einige Minuten gekocht, die Abkochung filtrirt. Stets wurde ein Infus von der Concentration 1 : 10 dargestellt (d. h. das Lösliche aus 1 g Drogue in 10 ccm Wasser), sollte eine schwächere Concentration angewandt werden, so wurde der Infus mit aq. destill. resp. physiol. ClNa-Lösung entsprechend verdünnt. Stets wandte ich frische oder nur kurze Zeit in kaltem Raume gestandene Infuse an. Letztere sahen mehr oder weniger braun oder grünbraun — je nach der Droge — und ausser den Sameninfusen auch stets klar aus; die Sameninfuse sahen auch nach der Filtration in Folge des zum Theil mitfiltrirenden Samenöls trübe aus.

1) Lindley, *Digitalium monographia*.

2) Bauer, F., *Digitalium monographia, sistens historiam etc.* Londini 1823.

3) Bruynwisch, Maatjes, *de Digitali ferruginea*. Dissert. medicae Groningiae 1804.

Zur Bereitung der Stengelinfuse nahm ich 10 g Stengel auf 10 ccm Wasser, d. h. das Lösliche aus 10 g Stengel in 10 ccm Wasser, da die Stengel doch ungeheuer viel Holz enthalten.

Das Eintreten der charakteristischen Wirkung bestimmte ich überall an Fröschen nicht nach dem systolischen Stillstande, sondern nach der Peristaltik der Herzkammer, die ebenso regelmäßig jedes Mal nach der Vergiftung des Frosches mit Digitalis in genügender Dosis eintrat wie der systolische Stillstand, aber nur ein weiteres Stadium der Digitalinwirkung aufs Froschherz darstellt.

1. *Digitalis purpurea* L.

Auf die wohl bekannte und in jedem Handbuche der Pharmakognosie angeführte botanisch-pharmakognostische Beschreibung der Pflanze gehe ich hier nicht ein und verweise in dieser Beziehung auf das Werk von Flückiger.¹⁾

a. Blätter.

Versuch 25.

Kleine Temporaria von 26 g.

- 0 h 36 m P = 38
- » 42 m Injection von 0,2 fol. Digit. pp. pulv. in 1 ccm Aq. in das linke Hinterbein.
- » 46 m P = 38
- » 48 m P = 38
- » 49 m P = 36
- » 50 m P = 38. Diastole sehr ausgesprochen und von längerer Dauer, als die Systole.
- » 52 m P = 38. Peristaltische Bewegungen des Herzens.
- » 54 m P = 35
- » 57 m Das Zählen der Pulse wird unmöglich infolge der Peristaltik und der Unvollkommenheit oder gar des völligen Ausbleibens der Schläge.
- 1 h 00 m Das Herz steht in Systole still, die Vorhöfe aber contrahiren sich noch.
- 1 h 45 m Peristaltische Contractionen der Kammer wieder aufgetreten.

Unterbrechung.

1) Flückiger, F. A., Pharmakognosie des Pflanzenreiches, 3 Aufl. 1891

5 h 00 m Der Frosch ist todt. Herz ist nur an der Spitze systolisch contrahirt (weiss).

Ergebniss: 1) Der Infus von fol. Digit. pp. zeigt alle charakteristischen Wirkungen der Digitalinstoffe aufs Herz;

2) die Dosis 0,2 fol. Digit. wirkt sehr rasch und heftig, daher folgender Versuch mit einer kleineren Dosis.

Versuch 26.

Kleine Temporaria von 29 g.

12 h P = 32; 12 h 03 m Injection von 0,02 g fol. Dig. pp. in 1 ccm aq. in den linken Oberschenkel. Da keine Veränderung eintritt, so wird 12 h 30 m noch eine Spritze desselben Infuses in den rechten Oberschenkel injicirt. 1 h 5 m noch eine Spritze. 1 h 23 m Diastole länger und stärker ausgeprägt. Goltzscher Klopversuch von ausgesprochenem Effect. 2 h 36 m ein Tropfen Wasser aufs Herz und passive Bewegung des Frosches. Mit einem Male tritt Peristaltik des Herzens ein. Unterbrechung. Frosch abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Bewegungen des Thieres normal. 5 h 25 m das Thier hat sich vollkommen erholt. Es starb erst am 3. Tage, wobei das Herz in systolischer Contraction gefunden wurde.

Der Versuch zeigt, dass das in Wasser Lösliche von 0,06 fol. Digit. purp. die toxische Dosis ist für einen mittelgrossen Frosch, der eben noch die charakteristischen Digitalinwirkungen hervorzurufen im Stande ist; 2) dass die peristaltischen Bewegungen des Herzens beim Frosche rückgängig werden können.

b. Samen.

Versuch 27.

Mittelgrosse Temporaria von 44 g.

6 h 02 m P = 53.

» 05 m Injection von 0,02 g sem. D. pp. in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.

» 07 m P = 57

» 10 m P = 56

» 16 m P = 52

18 m 0,02 g in den rechten Oberschenkel.

» 20 m P = 53

» 25 m P = 49. Systole energischer und länger.

» 34 m P = 35. Starke Peristaltik.

3 h 44 m P = 33. Ausserordentlich starke Systole. Bald wird die Spitze, bald die Basis des Herzens blasenartig aufgetrieben. Neigung zu permanenter Systole der Herzkammer.

55 m P = 30

7 h 04 m P = 22. Ungeheuer kleine Pulse.

13 m P = 22. Peristaltik verschwunden.

Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glocke gebracht, er bewegt sich normal.

2. Tag.

1 h 45 m P = 15. Active Bewegungen schwach, besonders schwach in den Oberschenkeln. Systole energisch. Schwache Peristaltik.

11 h 30 m Das Thier ist munter, wenn auch die Pulse sehr schwach und 8 pro Min. betragen. Keine Peristaltik mehr.

Unterbrechung.

3. Tag.

1 h 00 m P = 31. Das Thier hat sich vollständig erholt, es hüpft unter der Glasglocke herum. Auf den Rücken gebracht kehrt es sich prompt auf den Bauch um.

Abbruch.

Versuch 28.

Dasselbe Thier (vom Vers. 27).

1 h 45 m P = 33

2 h 05 m Injection von 0,04 g sem. D. pp. in 1 ccm Aq. in den rechten Oberschenkel. Sofort wird die Systole energischer.

14 m P = 27. Der Goltz'sche Versuch bewirkt 30 Sec. lang dauernden diastolischen Stillstand.

25 m P = 18. Peristaltik. Systole sehr energisch. Diastole klein.

Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glocke gesetzt. Bewegungen der Glieder sehr träge.

2. Tag.

1 h 55 m Das Thier liegt auf dem Rücken athmungs-, fast bewegungs- und reactionslos da. Nur von Zeit zu Zeit eine geringe Bewegung der vorderen Extremitäten. Die Herzkammer dauernd, aber nicht ausgesprochen systolisch, contrahirt, nur die Vorhöfe pulsiren schwach. P derselben = 6.

Unterbrechung.

3. Tag.

1 h 40 m Das Thier ist todt. Herzkammer in systol. Contraction, ganz blass und steinhart; Vorhöfe schlaff.
Abschluss.

Versuch 27 und 28 zeigen, dass die Samen der *Digitalis purpurea* viel energischer wirken, als die Blätter, — während 0,04 g der ersteren bereits einen Frosch tötten, üben letztere in dieser Dosis auf den Frosch fast gar keine Wirkung aus.

Versuch 29.

Grosse *Temporaria*.

Decapitirt, das Rückenmark ausgebohrt. Die Hinterbeine nach der bekannten Art präparirt. 12 h 8 m Zuckung beider Beine bei einer Stromstärke 250 mm RA. Die Beine befinden sich in 2 Schalen mit je 10 ccm physiol. ClNa-Lösung gefüllt. Zu einer Schale wird 0,2 ccm Infus. Digit. pp. hinzugesetzt. Nach 8 Minuten zuckt das vergiftete Bein bei 280 mm, das nicht vergiftete — bei 250 mm RA. Nach 18 Minuten zuckt das vergiftete bei 300 mm., das nicht vergiftete — bei 250 mm. Nach 28 Minuten zuckt das vergiftete bei 270, das nicht vergiftete — bei 230 mm. Nach 1 Stunde zuckt das vergiftete Bein bei 100 mm RA, das nicht vergiftete — bei 250 mm. Am nächsten Tage erwies sich das vergiftete Bein ganz unerregbar, das nicht vergiftete zuckte bei 230 mm RA.

Auf die isolirte Muskulatur wirkt also der Infus ebenso wie die reinen Bestandtheile der D. pp.: zunächst die Erregbarkeit (des Nerven) steigernd, dann lähmend. Wir haben übrigens das schon aus dem Versuch 25 erschliessen können, in dem der Versuchsfrosch dasjenige Bein, in welches die Injection gemacht worden war, späterhin nachschleppte.

2. *Digitalis nervosa* Steud. et Hochst.

Blätter länglich-lancettlich und am Blattstiele ganz kahl. Stengel lang und vielblüthig. Kelchblätter länglich-eiförmig, zugespitzt und wenig behaart, kürzer als die Hälfte der Kronenröhre. Krone oben flaumhaarig, der unterste Zipfel viel länger als die übrigen. Mehrjährige Pflanze, am östlichen Kaukasus un-

Turkmenien heimisch. Zahlreiche kleine Blüten. Kelch während der Blüthezeit 2—3 Linien lang.*)

a. Blätter.

Versuch 30.

Kleine *Temporaria* von 24 g.

- h 37 m P = 42
 43 m Injection von 0,2 *Digitalis nervosa* in 1 ccm Aq. unter die Haut des linken Hinterbeines.
 45 m P = 39
 51 m P = 36. Die Diastole überwiegt an Dauer die Systole und ist sehr ausgesprochen.
 52 m P = 38
 57 m P = 36
 2 h 01 m P = 38. Die Systole ist länger geworden als die Diastole.
 05 m P = 37
 10 m P = 38
 15 m P = 37
 2 h 24 m P = 36
 38 m P = 34
 47 m P = 31. Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt.
 4 h 40 m Der Frosch wird wiederum auf den Rücken abgebunden, worauf er mit einer sehr langen Herzdiastole reagirt (Goltz! Erhöhte Erregbarkeit des Vagus!)
 59 m P = 31
 5 h 07 m Injection von 0,2 fol. *Digit. nervosae* in 1 ccm Aq. unter die Haut des rechten Hinterbeines.
 13 m P = 26
 15 m P = 25
 47 m P = 8. Ganz für die Digitalinstoffe charakteristische peristaltische Herzbewegungen.

*) *D. nevosa* (Steud. et Hochst.! herb. un. itin.), foliis oblongo-lanceolatis cauleque glaberrimis, racemo longo multifloro, calycis segmentis ovato-oblongis acutis glabriusculis dimidio tubi corollae brevioribus, corollae apice tubulosis laciniis infima caeteris multo longiore. 24 in Caucaso orientali (Wilms! Jochen!) et Turcomania (Turcz.). *D. laevigata* C. A. Mey. enum. pl. Cauc. asp. p. 110, non Waldest. Kit. Habitus et folia *D. laevigatae*. Flores numerosiores, minores. Calyx per anthesin 2—3 lin. longus. (v. s.). De Cadolle, Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, Parisiis. MDCCCXLVI. Pars X. p. 450.

5 h 52 m P = 9

6 h 00 m Idem.

14 m Das Herz steht in Mittelstellung zwischen Systole und Diastole zeitweilig still. Athmung normal. Active Bewegungen fast ganz verschwunden, — der Frosch ist ganz bewegungslos.

6 h 19 m Ab und zu eine peristaltische Herzbewegung. Athmung normal. Fast bewegungslos.

23 m P = 12. Die Herzspitze ist contrahirt, nur der oberer Theil des Herzens pulsirt, wobei peristaltische Wellen hinüberlaufen.

50 m Partielle Pulsationen des Ventrikels.

7 h 09 m Das Herz ist schwach systolisch contrahirt, ab und zu eine peristaltische Herzbewegung. Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt.

Folgender Tag.

10 h 50 m Der Frosch ist todt, das Herz in systolischer Contraction.

Ergebniss: Der Versuch ergab, 1) dass die Digitalis nervosa alle Eigenschaften der Pflanzen der Digitalisgruppe was die Wirkungen desselben auf den Frosch betrifft, besitzt.

2) dass die Affection der Bewegungsorgane aber hier besonders hervortritt. Das kann nun folgendermaassen erklärt werden: fast alle übrigen Drogen der Digitalisgruppe besitzen Stoffe die die Bewegungsorgane afficiren. Je mehr wir daher von einer Drogue einem Frosche einverleiben, desto stärker wird die betreffende Wirkung hervortreten -- 0,4 g, wie wir im gegebenen Falle angewandt haben, hatten wir aber früher nicht angewandt, und mag darin die stärkere Affection der Bewegungsorgane ihren Grund haben.

Im folgenden Versuche wird das isolirte Froschherz an Williams'schen Apparate unter dem Einflusse von Digitalis nervosa beobachtet.

Versuch 31.

Grosse Temporaria. Brustbein und oberer Theil der Bauchdecken werden entfernt. Untere Hohlvene, Sinus venosus und bulbus Aortae werden unterbunden. Im bulbus wird ein kleiner

geschnitten gemacht, eine gebogene Kanüle eingeführt und durch einen Faden an den Rändern der Schnittöffnung befestigt. Das Herz sammt den Lungen durch einen Scheerenschnitt von den Verbindungen mit dem Froschkörper gelöst und am Williams'schen Apparate befestigt.

T	P	Q	Bemerkungen.
11 h 50 m	28	4,5	Schafsblut 60 ccm + 40 ccm physiolog. ClNa-Lösung, davon 50 ccm.
52 m	37	5,5	
54 m	50	4,5	
57 m	48	4,0	
12 h 01 m	45	5,5	0,4 fol. Digit. nerv. in 2 ccm Aq.
04 m	43	5,5	
06 m	43	5,5	
10 m	—	—	
13 m	41	5,5	Peristalt. Herzbewegungen. Starke Peristaltik. Die Systole überdauert bedeutend die Diastole. Letztere wird mit jedem Schläge kleiner.
15 m	41	5,0	
19 m	37	4,25	
22 m	—	—	
25 m	11	4,0	Stillstand des Ventrikels in Systole, die Vorhöfe machen noch ab und zu eine sehr schwache Contraction. Es pulsiren nur die Vorhöfe und der obere Theil des Ventrikels.
28 m	25	3,75	
30 m	24	4,5	
33 m	23	3,25	
37 m	12	4,5	
40 m	—	—	Auch die Vorhöfe stehen still.
50 m	—	—	Das Blut wird entfernt, das Herz durch physiol. ClNa-Lösung durchgespült und 50 ccm der früheren Blutmischung in den Apparat gethan.
55 m	—	—	Das Herz ist bewegungslos.
1 h 00 m	—	—	
2 h 00 m	—	—	
05 m	—	—	Ein starker electr. Reiz aufs Herz ausgeübt bleibt ohne Erfolg. Der Versuch ist abgeschlossen.

Ergebniss: 1) Die Wirkungen der Digit. nervosa aufs Herz treten ohne Vermittelung des Centralnervensystem ein.

2) die Dose 0,4 g auf 50 ccm Blut in den künstlichen Kreislauf gebracht erweist sich als viel zu gross und wirkt auf das Herz fast fulminant, schleunigst dasselbe tödtend.

Versuch 32.

Frosch mittlerer Grösse. Die Hinterbeine werden abpräparirt, an den Kniegelenken abgeschnitten und jedes Bein in ein apartes Schälchen mit 10 ccm physiolog. ClNa-Lösung gelegt.

- 5 h 42 m Beide Hinterbeine zucken bei 200 mm RA.
 » 49 m In ein Schälchen (Bein = B) wird 0,2 Digit. nervosum in 1 ccm Aq. gethan.
 » 55 m Z im A bei 200
 Z im B bei 250
 6 h 01 m Z im A bei 200
 Z im B bei 250
 07 m Z im A bei 230
 Z im B bei 230
 22 m Z im A bei 200
 Z im B bei 200
 » 51 m Z im A bei 220
 Z im B bei 250
 7 h 06 m Z im A bei 210
 Z im B bei 160 Unterbrechung.

Folgender Tag.

- 11 h 42 m Z im A bei 220
 Z im B = 0 auch bei grösster Stromstärke — vollständiger Uebereinanderschiebung der Rollen. Nur die Endphalangen, die aus dem Flüssigkeitsniveau in der Schale hervorragten, zeigen bei grösster Stromstärke eine schwache Zuckung. Farbe und Durchsichtigkeit des Muskelgewebes scheint nicht verändert zu sein.

Ergebniss: Im Grossen und Ganzen scheint die Wirkung der Digit. nerv. auf die quergestreifte Muskulatur mit der reinen Stoffe der Digit. purpurea identisch zu sein.

Versuch 33.

Kleine Temporaria von 17 g.

- 6 h 05 m P = 56
 » 14 m P = 54
 » 15 m P = 56
 » 19 m Injection von 0,2 Digit. nerv. unter die Haut des linken Hinterbeines.
 » 20 m P = 57
 » 24 m P = 46
 » 25 m P = 52
 » 27 m P = 50. Ein Tropfen Aq. aufs Herz. Goltz'sche Vers. ohne Effect.

- h 30 m P = 53
 » 32 m P = 51
 » 33 m P = 41. Lebhaftige Bewegungen, danach Diastole des Herzens 15 Sec. lang (Goltz!).
 » 36 m P = 50. Auf Goltz'schen Vers. 15 Sec. lange Herzdiastole.
 » 39 m P = 53
 » 42 m P = 53
 » 46 m P = 50
 h 55 m Injection von 0,1 Digit. nervosa in 0,5 Aq. in das rechte Hinterbein.
 » 58 m Peristaltische Herzbewegungen.
 h 02 m P = 47. Heftige peristalt. Bewegungen des Herzens. Auf Goltz'schen Vers. Diastole 20 Sec. lang. Athmung und Bewegungen normal.
 » 10 m P = 16
 15 m Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt. Er bewegt sich normal. Unterbrechung. Nächster Tag.
 h 40 m Tod des Frosches. Herz stark systolisch contrahirt.
 Ergebniss: 1) 0,3 g Digit. nervosae ist eben die Dose, die die charakteristischen Wirkungen aufs Froschherz hervorruft.

2) Es ist hervorzuheben, dass die Wirkung der Digit. nervosae, wenn überhaupt (richtige Dose!), ausserordentlich rasch, schneller als das bei Digit. purpurea der Fall ist, eintritt (relativ viel Digitalein enthalten?).

3) Die wirksamen Stoffe d. Digit. purp. dürften sich zu jenenigen der Digit. nerv. wie 1 : 1,5 verhalten, denn um die Wirkungen in derselben Intensität, wie in diesem Falle hervorgerufen, von der Digit. purp. nur 0,2 nöthig ist.

b. Samen.

Versuch 34.

Mittelgrosse Temporaria von 32 g.

- h 00 m P = 32
 » 01 m P = 32
 » 03 m P = 32
 » 07 m Injection von 0,2 g sem. Digital. nervosae in 1 ccm Aq. unter die Haut des linken Hinterbeines.

- 1 h 08 m P = 34
 » 11 m P = 32
 » 13 m P = 32
 » 15 m P = 30
 » 16 m P = 30
 » 17 m P = 29. Auf den Goltz'schen Vers. eine kurze dauernde Diastole.
 » 20 m P = 29. Schwache Peristaltik. Die Systole nimmt an Energie und Dauer von Schlag zu Schlag zu, das Herz zeigt überhaupt die Neigung mehr in Systole zu verbleiben.
 24 m P = 20. Starke Peristaltik. Die Systole dauert sehr lange. Den Vorhöfen gelingt es kaum das Blut in den Ventrikel hineinzupressen.
 28 m Stillstand des Ventrikels in Systole (weisse Farbe der Vorhöfe pulsiren noch. Auf den Goltz'schen Vers. — 20 Secunden langer diastol. Stillstand der Vorhöfe, der Ventrikel aber bleibt systol. contrahirt. Als die Vorhöfe wieder zu pulsiren anfangen, folgt eine schwache Ventrikelerschaffung peristalt. Characters. Athmung und Bewegung ganz normal.
 » 34 m P d. Vorh. = 7. Peristaltik der Vorhöfe.
 » 37 m P d. Vorh. = 4
 » 39 m P d. Vorh. = 3. Der Ventrikel ausserordentlich zusammengeschrunft und ganz weiss. Athmung und Bewegung normal.
 » 45 m P d. Vorh. = 5. Die Vorhöfe strotzend mit Blut gefüllt. Auf den Goltz'schen Vers. — ein minutes langer diastol. Stillstand der Vorhöfe. Der Ventrikel bleibt contrahirt.
 50 m Stillstand der Vorhöfe.
 55 m Idem. Athmung und Bewegungen normal. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt. Er bewegt sich lebhaft und hüpfet umher. Auf den Rücken gebracht kehrt er sich gleich auf den Bauch um. Auf mechan. Reize (Drücken der Phalangen) reagirt er schwach. Das linke Hinterbein wird nachgeschleppt.
 Unterbrechung.
 5 h 00 m Der Frosch ist todt. Herz ausserordentlich zusammengeschrunft und ganz weiss. Auf Reiz mit dem Inductionsstrome längs der Wirbelsäule zucken alle Glieder ausser dem linken Hinterbeine ausserordentlich stark. Beim Electriciren des rechten Hinterbeines zucken alle Theile gleich stark, während am linken der Oberschenkel ganz unerregbar ist.

Beim Electrisiren des rechten N. ischiadicus zuckte das betreff. Bein stark, während beim Electrisiren des linken N. isch. keine Zuckung erfolgte.

Ergebniss: 1) Die Samen d. Digit. nerv. wirken mindestens ebenso stark digitalinartig, wie die Blätter.

2) Die Wirkungsweise der Samen ist für Digitalinstoffe ganz typisch.

3) Die Muskeln und Nerven in Contact mit sem. digit. rv. in einer Concentration von 0,2 : 1 cem Aq. werden rasch getödtet (vergl. den Oberschenkel links), in unserem Falle nämlich binnen einer Stunde.

Versuch 35.

Kleine Temporaria von 26 g.

h 07 m P = 38

12 m Injection von 0,1 g sem. Digital. nervosae in 1 cem Aq. unter die Haut des linken Hinterbeines.

16 m P = 30

20 m P = 36. Die Systole ausgiebiger und länger. Die Diastole — von ganz kleinen Excursionen. Auf Goltz'schen Versuch — 10 Sec. lange Diastole.

30 m P = 35. Die diastol. Erschlaffungen ganz unbedeutend. Goltz'scher Vers. effectlos.

34 m Der Ventr. sehr klein und ganz weiss auch während der diastol. Erschlaffung. Die Vorhöfe mühen sich ab ein Spürchen Blut in den Ventr. zu pressen. Athmung und Bewegungen normal. Das linke Bein wird activ schwächer bewegt als das rechte.

h 40 m P = 32

50 m P = 24

52 m Stillstand des Ventrikels und der Vorhöfe in Systole.

55 m Auf den Schmiedeberg'schen Versuch macht das Herz noch ein Paar Contractionen, wobei der Ventrikel wieder still stehen bleibt, die Vorhöfe aber sich weiter noch schwach contrahiren.

h 05 m Stillstand der Vorhöfe. Bei Application eines electr. Reizes auf den sinus venosus, Vorhöfe und Ventrikel — kein Effect an denselben, während die oberen Extremitäten dabei zucken.

- 12 h 10 m Athmung und Bewegung ganz schwach. Erträgt die Rückenlage. Nach Abduction der Beine wird das rechte activ zurück adducirt; das linke nicht.
- « 15 m Athmung und Bewegung schwach. Nicht nur das Herz, sondern auch die Aorten ausserordentlich stark zusammengezogen — auf das Vierfache im Durchmesser reducirt, fast bis zum Verschwinden des Lumens, denn sie sehen ganz weiss und dünn wie Nerven aus.
- « 45 m Auf den Teller gebracht bewegt sich der Frosch sehr schwach. Liegt mit Brust und Leib dem Teller an.
- « 50 m Der Frosch ist todt. Herz und Aorten stark zusammen geschrumpft und ganz weiss.

Section: Auch die Bauchadorten und die vena cava imerscheinen dünner als normal zu sein.

- 2 h 55 m Auf Reizung durch den Induct.-Strom bei 160 mm R des rechten N. ischiad. — sehr energische Streckung des rechten Beines; — des linken N. ischiad. — nur schwache Zuckung der Fussmuskeln. Electr. Reiz. der Haut des rechten Oberschenkels bei 100 mm — Streckung, des linken — keine Bewegung. Beim Electrisiren des Rückens längs der Wirbelsäule — Streckung des rechten Beines; das linke bleibt unbeweglich. Abschluss.

Ergebniss: 1) Auch 0,1 g der Samen wirkt ausserordentlich stark.

2) Es ist das Fehlen der peristaltischen Bewegungen hervorzuheben, was nur durch die zu rasche und starke Wirkung zu erklären ist.

3) Ganz augenscheinliche Verengerung der Gefässe.

Versuch 36.

Kleine Temporaria von 27 g.

- 1 h 25 m P = 34
- » 30 m Injection von 0,05 g sem. Digit. nerv. in 1 ccm A unter der Haut des linken Oberschenkels.
- » 35 m P = 34
- » 45 m P = 35
- » 55 m Dauer und Energie der Systole ausgesprochener als früher.
- » 58 m P = 36. Peristaltik des Ventrikels.
- 2 h 03 m P = 36. Bei jeder Systole wird abwechselnd bald die Spitze, bald die Basis des Herzens vorgebaucht.

Es macht den Eindruck, dass das Herz ein Quantum Blut in sich behält und bei der Contraction dasselbe bald von der Spitze nach der Basis, bald umgekehrt stösst und dabei immer peristaltisch, d. h. in Form einer hinüberlaufenden Welle.

2 h 08 m P = 34

» 10 m P = 33

» 17 m Der Ventrikel zeigt die Neigung dauernd systol. contrahirt zu verbleiben, und die Vorhöfe mühen sich ab bei jeder Systole ein kleines Quantum Blut in den Ventr. zu pressen, welches dabei eine partielle Diastole der Ventrikelwand hervorruft.

» 25 m Auf mechan. Reize (Druck) reagirt das rechte Bein viel stärker als das linke. Die activen Bewegungen abgenommen.

» 30 m P = 17. P d. Vorh. = 34. Eine Ventrikeldiastole bedarf zweier Vorhofscontractionen. Peristaltik.

» 34 m P = 32.

3 h 10 m P = 14. Peristaltik. Athmung normal. Active Beweg. von geringer Energie. Linkes Bein schwächer als rechtes.

Unterbrechung. Abgebunden und unter die Glocke gesetzt, erträgt der Frosch die Rückenlage. Brust und Kopfhaltung normal. Hüpfte unter der Glocke umher.

5 h 30 m P = 16. Sehr schwache Dilatationen des Ventrikels, der blass und zusammengeschrumpft aussieht. Peristaltik nicht mehr vorhanden.

6 h 35 m P = 17. Nur die Basis dilatirt sich in der Diastole, die Spitze aber bleibt systol. contrahirt.

» 45 m P = 23. Wieder geringe Peristaltik, auch an der Herzspitze. Heftigere Körperbewegungen gingen voraus.

55 m P = 18. Peristaltik nicht mehr vorhanden. Auf den Rücken gelegt kehrt sich der Frosch nicht mehr auf den Bauch um.

7 h 00 m Das Fenster wird vergrössert, damit die Vorhöfe beobachtet werden können, da das zusammengeschrumpfte Herz in die Brusthöhle versank.

» 07 m Ganz deutliche peristaltische Bewegungen der Vorhöfe. Die Aorten sind um das Mehrfache zusammengeschrumpft und blass, sehen ganz wie Nerven aus.

» 10 m Der Frosch liegt auf dem Rücken wie todt da, ab und zu zeigt er eine geringe Bewegung als Zeichen des Lebens.

Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glocke gesetzt.

Bewegt sich nicht und liegt mit Kopf und Brust dem Teller an Nächstem Tag.

10 h 15 m Tod des Frosches. Herz in Mittelstellung zwischen Systole und Diastole. Rigor mortis stark ausgeprägt.

Ergebniss: 1) Sem. Digit. nerv. wirkt typisch digitalinartig.

2) Die Wirkung ist um das Mehrfache stärker, als die der fol. Digit. nerv., sowie auch der fol. Digit. purp.

3) Ungemein starke Affection (Lähmung) der Bewegungsorgane.

c. Samenkapseln.

Versuch 37.

Kleine Temporaria von 21 g.

11 h 18 m P = 34

» 20 m Injection von 0,2 g Samenkapseln von Digit. nerv. in 1 ccm Aq. unter die Haut des linken Oberschenkels.

» 33 m P = 31

» 35 m P = 30. Peristaltik des Ventrikels.

» 38 m P = 25

» 42 m Der Ventrikel ist eigentlich dauernd systol. contrahirt und erschlafft während d. Diastole nur unbedeutend, indem über ihn eine peristaltische Welle hinüberläuft.

» 45 m P = 13

» 52 m Auf Goltz's Vers. kein Effect.

» 55 m P = 21

12 h 00 m P = 14. Der linke Oberschenkel viel weniger beweglich als d. rechte.

» 20 m P = 14

» 24 m Goltz's Vers. effectlos. Peristaltik.

» 40 m P = 13. Die Spitze ist dauernd systol. contrahirt und nur die Basis erschlafft während der Diastole. Active Beweg. gering.

1 h 07 m P = 13

» 16 m P = 13

2 h 10 m P = 11

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt. Er bewegt sich energisch. Der linke Oberschenkel ist ganz bewegungslos, und nur der Unterschenkel und der Fuss sind am linken Hinterbeine beweglich.

5 h 00 m P = 13. Geringe Peristaltik. Nur die Basis pulsirt, während die Spitze dauernd systol. contrahirt.

ist und ganz blass aussieht Active Bewegungen sehr spärlich, kehrt sich vom Rücken auf den Bauch nicht mehr um. Bei Application eines starken electr. Reizes durch den Inductionsstrom auf den Rücken wird das rechte Bein prompt gestreckt, das linke zuckt nur wenig.

15 h 27 m $P = 9$

17 h 10 m Tod. Nur die Herzspitze ist ausgesprochen systol. contrahirt, die Herzbasis ist schlaff.

Ergebniss: 1) Die Samenkapseln von *Dig. nervosa* erzeugen am Frosch sämtliche charakteristische Digitalinwirkungen.

2) Der Gehalt an wirksamen Stoffen scheint in den Samenkapseln demjenigen in den Blättern gleich zu sein.

d. Stengel.

Versuch 38.

Kleine Temporaria.

12 h 42 m $P = 38$

» 51 m Injection von 0,5 g stipites *Digit. nerv.* unter die Haut des linken Oberschenkels.

» 57 m $P = 33$

» 58 m $P = 31$

1 h 00 m $P = 31$

» 03 m $P = 30$. Diastole ausgiebiger und länger dauernd als vor der Einspritzung.

» 10 m $P = 29$

» 22 m $P = 28$

» 28 m $P = 28$

» 30 m Injection von 0,5 g unter die Haut des rechten Oberschenkels.

» 35 m $P = 29$. Systole ebenso energisch und anhaltend geworden wie die Diastole.

1 h 44 m Massage der Oberschenkel.

» 45 m $P = 19$. Diastole in 2 Absätzen erfolgend und lange anhaltend. Systole energisch.

» 55 m $P = 17$. Systole viel energischer und ausgiebiger als Diastole, aber von gleicher Dauer wie letztere.

2 h 00 m $P = 17$. Andeutung von Peristaltik. Diastole nicht ausgiebig, aber länger dauernd als die Systole. Letztere sehr energisch.

» 13 m Der Frosch ist ganz athmungs- und bewegungslos, reagirt auf äussere Reize (Druck) nicht. Vom Brett abgebunden bewegt er sich nicht.

- 2 h 18 m P = 17. Ganz deutliche aber geringe Peristaltik.
 » 22 m Ganz deutliche Peristaltik. Athmungs- und bewegungslos. Zuckungen in den Gliedern.
 » 25 m Diastole gering, Systole sehr energisch.
 » 27 m Der Frosch wird massirt. Peristaltik des Ventrikels stärker geworden: Hervorbauchung d. mittleren Theiles des vorderen Ventrikelwand in d. Diastole — partielle Diastole.
 » 33 m Peristaltik ausgiebiger und stärker. Zuckungen in den Gliedern.
 » 35 m Starke Peristaltik. Ab und zu zeitweiliger kurzer Stillstand in Diastole.
 » 37 m Athmungs- und fast ganz bewegungslos. Auf mechan. Reize — keine Reflexe. Starke Peristaltik.
 » 42 m Zuckungen in d. Gliedern.

3 h 00 m Athmungs- und bewegungslos.

Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glocke gesetzt.

5 h 37 m P = 9. Peristaltik. Der Frosch liegt auf dem Rücken wie todt da, athmet nicht, bewegt sich nicht und nur das Herz zeigt Leben.

- » 45 m Auf starke electr. Schläge mit dem Inductionsstrom — sehr geringe Reaction. Die Oberschenkel der Hinterbeine reagiren am wenigsten.

6 h 15 m Die Herzthätigkeit geschieht jetzt derart, dass nach einer etwa 30 Sec. lang dauernden sehr ausgiebigen Diastole mehrere stärkere peristalt. Wellen am Herzen hinüberlaufen. In den Zwischenpausen dieser Erscheinungen verbleibt das Herz mehr in systol. Stellung und erschläfft nur sehr unbedeutend während der schwachen Diastolen.

6 h 24 m P = 0. 90 Sec. langer sehr ausgiebiger diastol. Stillstand, danach Peristaltik. Zuckungen in den hinteren Extremitäten.

Unterbrechung.

Nächster Tag.

4 h 22 m P = 5. Ab und zu eine peristalt. Welle. Zuweilen längerer diastol. Stillstand. Im Ganzen sind die Contractionen sehr schwach.

- » 30 m Zeitweiliger mehrere Minuten langer diastol. Stillstand. Ein Tropfen Atropin aufs Herz. Das Fenster vergrößert zur Beobachtung der Vorhöfe.

- » 45 m P = 6. Das Herz zusammengeschrumpft. Venensinus und Vorhöfe zeigen grössere Energie der Pulsationen als d. Ventrikel.

5 h 20 m Ventrikel dauernd systol. contrahirt. Vorhöfe pulsiren noch. Aorten stark contrahirt.

h 00 m Status idem.

Unterbrechung. Frosch unter die Glocke.

Nächster Tag.

2 h 15 m Tod des Frosches. Ventrikel in Systole, Vorhöfe in diastolischem Erschlaffungszustande. Muskelstarrestark ausgeprägt. Auf d. stärksten electr. Schläge — keine Reaction.

Ergebniss: 1) Die Stengel von *Digitalis nervosa* enthalten ebenfalls Digitalinstoffe, wenn auch in geringer Quantität.

2) Sie enthalten auch Stoffe, die zunächst reizend, dann aber lähmend wirken (auf das Central-Nervensystem?). Es sind möglicherweise präformirte oder vielleicht auch nachher entstandene Zersetzungsproducte der Digitalinstoffe — Digitaliresin resp. Toxiresin.

Zur Beobachtung letzterer Erscheinungen — nächster Versuch.

Versuch 39.

Kleine Temporaria von 20 g.

- 3 h 55 m Injection von 1,0 g stipites *Digit. nerv.* in 2 ccm Aq. unter die Haut des Rückens. Hüpfte unter der Glocke umher.
- 4 h 00 m Zuckungen in der rechten hinteren Extremität. Athmet mit geöffnetem Munde.
- » 05 m Zuckungen in der linken hinteren Extr. Athmet mit geöffnet. Munde.
- 08 m Stärkere Zuckungen in beiden hinteren Extremitäten. Active Beweglichkeit in den hinteren Extremitäten scheint geringer geworden zu sein.
- » 15 m Sitzt still. Kopf und Brust aufgerichtet.
- » 30 m Liegt mit Kopf und Brust dem Teller an. Ab und zu Streckung der hinteren Extremitäten.
- 4 h 35 m Sitzt still. Kopf und Brust dem Teller angelegt.
- » 42 m Der Frosch erträgt die Rückenlage. Liegt auf dem Rücken still. Auf starken Druck durch die Pincette — keine Reaction. Athmet nicht mehr.
- » 52 m Liegt auf dem Rücken athmungslos. Ab und zu Streckung der hinteren Extremitäten.
- 5 h 00 m Vordere Extremitäten vollkommen gelähmt, hintere zeigen noch spontane Beweglichkeit.

- 5 09 m Sehr geringe spontane Beweglichkeit der hinteren Extremitäten.
- » 12 m Fibrilläre Zuckungen in den Oberschenkeln. Vorherkommenes Fehlen der Reflexe.
 - » 18 m Mehrfache Streckung der hinteren Extremitäten.
 - » 20 m Fensterschnitt, Herz vorgestülpt aus dem eröffneten Herzbeutel.
 - » 25 m $P = 19$. Herz verhältnissmässig sehr klein. Systole energisch, Diastole sehr schwach. Geringe Beweglichkeit der hinteren Extremitäten immer noch vorhanden.
 - » 28 m $P = 20$
 - » 35 m $P = 21$. Streckung der hinteren Extremitäten.
 - » 52 m $P = 22$. Vollständige dauernde Bewegungs- und Athmungslosigkeit. Auf Goltz's Versuch kein Effect.
- 6 h 05 m Peristaltik des Ventrikels. Vordere Extremitäten für starke electr. Schläge ganz unerregbar. Hintere -- bei 120 mm RA eben erregbar.
- » 34 m $P = 17$. Peristaltik.
 - » 45 m Auf electr. Schläge bei 120 mm RA Zuckungen der hinteren Extremitäten.
- Unterbrechung.

Nächster Tag.

- 11 h 30 m Tod des Frosches. Herzspitze systol. contrahirt und ganz blass. Der mittlere Theil und die Basis des Herzens in Diastole. Vorhöfe ebenso schlaff. Aorta leer, nicht contrahirt. Todtenstarre stark ausgeprägt. Vordere Extremitäten für electr. Reize ganz unerregbar. Hintere Extremitäten zeigen bei Application starker electr. Schläge geringe Zuckungen. Rückenmark und NN. ischiadici für electr. Reize ganz unerregbar.

Ergebniss: Der Versuch ergibt, 1) dass der Stengelinfus von *Digit. nervosa* in relativ grosser Menge Stoffe enthält, die zunächst reizen und Krämpfe erregen, nachher aber das Centralnervensystem und die Muskeln lähmen. Es ist Zerfallsproducte der wirksamen Digitalisbestandtheile anzunehmen -- Digitaliresin und Toxiresin.

2) Wirksame Digitalinstoffe sind in den Stengeln unzufolge vorhanden, aber in relativ geringer Menge.

3. *Digitalis gigantea* Fisch.

a. Blätter.

Versuch 40.

Kleine Temporaria von 32 g.

- 1 h 10 m P = 47
 » 17 m P = 52
 » 22 m P = 52
 » 25 m Injection von 0,05 ccm Digit. gigantea in den linken Oberschenkel.
 » 35 m P = 45
 » 47 m P = 47
 » 50 m Da sich nichts geändert hat, so wird noch 0,05 ccm in denselben Schenkel injicirt.
 » 58 m P = 45. Systole energischer.
 2 h 24 m P = 40
 » 28 m Injection von 0,05 ccm Digit. gigantea in denselben Oberschenkel.
 » 50 m P = 39. Heftige Peristaltik. Systole sehr energisch. Athmung und Bewegungen normal.
 1 h 02 m P nicht möglich zu zählen. Heftige Peristaltik. Der linke Oberschenkel paretisch.
 » 11 m Auf den Goltz'schen Vers. 20 Sec. langer diastol. Stillstand des Herzens.
 » 57 m Peristaltik dauert fort in unregelmässigster Weise. Es kommt gar nicht zur Systole der Kammer, sondern die Diastole herrscht vor, häufig ziemlich langdauernder diastolischer Stillstand der Kammer.
 2 h 12 m Keine weitere Veränderung.
 Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt. Bewegt sich ordentlich. Linkes Bein paretisch.
 5 h 15 m P = 23. Peristaltik geringer. Liegt auf dem Rücken ruhig, rechtes Bein angezogen, linkes schlaff.
 6 h 47 m Keine weitere Veränderungen.
 Unterbrechung. Wird unter die Glasglocke gesetzt. Bewegt sich nicht.

Nächster Tag.

- 1 h 10 m Der Frosch scheint todt zu sein, — Herzspitze systol. contrahirt, Basis und Vorhöfe schlaff, aber als das Fenster bedeutend vergrössert wurde zur besseren Ueberschauung der Verhältnisse, fing das Herz plötzlich zu schlagen an. Der Frosch ist aber vollkommen athmungs- und bewegungslos. Electr. Erregbarkeit in geringem Grade erhalten, im linken Oberschenkel am geringsten.

- 11 h 27 m Stillstand der Kammer, — Basis schlaff, Spitze systol. contrahirt. Die Vorhöfe pulsiren noch, $P = 7$.
 6 h 50 m Der Frosch ist todt. Herzspitze systol. contrahirt. Vorhöfe schlaff.

Versuch 41.

Grosse *Temporaria* von 70 g.

Decapitirt, das Rückenmark ausgebohrt. 5 h 40 m Die vorderen Extremitäten amputirt, die Haut abgezogen und jedes Bein in eine besondere Schale mit 10 ccm physiolog. ClNa-Lösung gelegt. Bei der Prüfung mit dem Inductionsstrome erweisen sich beide gleich stark erregbar bei 230 mm RA.

5 h 48 m Zu einer Schale (= B) wird 1 ccm Infus. fol. *Digitalis giganteae* zugesetzt, enthaltend das Lösliche aus 0,1 g Blätter. Die andere Schale = A.

- » 53 m : Zuckung in A = 250 mm.
 Zuckung in B = 260 mm.
 6 h 00 m : Zuckung in A = 250 mm.
 Zuckung in B = 270 mm.
 » 06 m : Zuckung in A = 250 mm.
 Zuckung in B = 270 mm.
 » 12 m : Zuckung in A = 250 mm.
 Zuckung in B = 280 mm.
 » 18 m : Zuckung in A = 240 mm.
 Zuckung in B = 300 mm.
 » 24 m : Zuckung in A = 240 mm.
 Zuckung in B = 290 mm.
 » 30 m : Zuckung in A = 240 mm.
 Zuckung in B = 280 mm.
 » 36 m : Zuckung in A = 240 mm.
 Zuckung in B = 290 mm.
 » 42 m : Zuckung in A = 240 mm.
 Zuckung in B = 260 mm. Unterbrechung.

Nächster Tag.

- 11 h 45 m : Zuckung in A = 230 mm.
 Zuckung in B = 210 mm. Farbe und Durchsichtigkeit in beiden gleich, unverändert.
 6 h 45 m : Zuckung in A = 230 mm.
 Zuckung in B = 150 mm. Abbruch.

Versuche 40 und 41 zeigen, dass die Blätter von *Digitalis gigantea* Fisch. Stoffe enthalten, die qualitativ sowie quantitativ denjenigen der *Digitalis purpurea* L. gleichzukommen scheinen. Die nur langsam eintretende Absterbung des Beines im Versuche 41 ist durch die relativ zu geringe Giftdosis zu erklären.

b. Samen.

Versuch 42.

Kleine Temporaria von 35 g.

- h 57 m P = 47
 h 00 m Injection von 0,05 ccm sem. Digit. gigant. Fisch. in den linken Oberschenkel.
 » 03 m P = 61
 » 05 m P = 61
 » 07 m P = 54. Heftige peristaltische Bewegungen; bald contrahirt sich die rechte Ventrikelwand, bald die linke. Goltz's Vers. effectlos.
 » 14 m Partielle Diastole des Ventrikels. Auf 2 Vorhofscontractionen folgt nur eine Ventrikelcontraction.
 » 17 m P = 24, P der Vorh. = 48. Auf Goltz's Vers. folgt ein 25 Sec. langer diastol. Stillstand des Ventrikels und der Vorhöfe.
 h 24 m Stillstand des Ventrikels in Systole, Vorhöfe arbeiten noch. In Bezug auf die Athmung und die Bewegung der Glieder Alles normal.
 » 26 m P der Vorhöfe = 31.
 » 27 m Durch den Schmiedeberg'schen Vers. gelingt es wohl den Ventrikel gewaltsam mit Blut zu füllen, nicht aber wieder zum Schlagen zu bringen.
 » 36 m P der Vorh. = 7 — in der ersten Hälfte der Minute, in der anderen Hälfte — diastol. Stillstand der Vorhöfe. Athmung und Bewegungen schwächer, das linke Bein nicht weniger activ beweglich als das rechte.
 » 50 m P der Vorhöfe = 3.
 » 52 m Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Er ist fast ganz bewegungslos.

Unterbrechung.

Nächster Tag.

- h 15 m Der Frosch ist todt. Ventrikel in ausgesprochener systol. Contraction, Vorhöfe schlaff. Electr. Erregbarkeit in beiden Oberschenkeln erloschen; der rechte Unterschenkel zuckt stark, der linke — fast gar nicht.

Versuch 43.

Kleine Temporaria von 28 g.

- h 45 m P = 34
 » 52 m Injection von 0,02 ccm sem. Digit. gigant. Fisch. in den linken Oberschenkel.
 » 55 m P = 35
 h 02 m P = 35. Systole stärker.

11 h 10 m Andeutung von Peristaltik des Ventrikels.

» 15 m $P = 34$

» 25 m Ein Tropfen ClNa -Lösung aufs Herz.

» 26 m $P = 35$. Systole ausserordentlich stark. Andeutung von Peristaltik.

» 32 m $P = 33$

» 58 m Noch ein Paar Tropfen physiol. ClNa -Lösung aufs Herz. Athmung normal. Bewegungen der Glieder etwas schwächer.

12 h 10 m $P = 31$

» 20 m $P = 33$. Die Diastole des Ventrikels geschieht in 2 Absätzen.

» 25 m Die Diastole geschieht jetzt nur in einem Absatz. Active Bewegungen der Glieder und Athmung normal.

» 47 m $P = 32$

1 h 05 m Geringe peristaltische Bewegungen der Kammern. Diastole ungewöhnlich stark ausgesprochen.

» 41 m $P = 33$. Das Herz scheint sich ganz erholt zu haben und normal zu schlagen. Athmung und Bewegung der Glieder ganz normal, nur der linke Oberschenkel bleibt etwas in der Bewegung zurück.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Er bewegt sich ganz schwach, das linke Bein paretisch.

5 h 00 m Der Frosch ist ziemlich munter und scheint sich ganz erholt zu haben.

Versuche 42 und 43 ergeben, dass die Samen von *Digitalis gigantea* Fisch. ungemein stark wirken und dabei typisch digitalinartig. Die Dosis, die noch eben im Stande ist Wirkung hervorzurufen, ist 0,02 g, also noch viel kleiner als diejenige der Samen von *Digitalis purpurea* (0,04 g).

c. Samenkapseln.

Versuch 44.

Kleine *Temporaria* von 30 g.

11 h 50 m $P = 31$

» 52 m Injection von 0,05 ccm Samenkapseln von *Digitalis gigantea* Fisch. in den linken Oberschenkel.

12 h 03 m $P = 33$. Systole viel energischer.

» 11 m $P = 36$

» 17 m $P = 33$. Andeutung von Peristaltik.

» 23 m $P = 34$. Geringe peristalt. Bewegungen des Ventrikels.

- h 34 m P = 34
- » 43 m P = 36. Geringe peristalt. Bewegungen des Ventrikels. Auf Goltz's Vers. 10 Sec. langer diastolischer Stillstand.
- » 58 m P = 34. Ganz deutlich ausgesprochene u. charakteristische Peristaltik der Kammer. Auf Goltz's Vers. 20 Sec. langer diastol. Stillstand.
- h 10 m P = 31
- » 37 m P = 32. Sehr heftige peristaltische Bewegungen der Kammer. Athmung und Bewegungen normal. Das linke Bein in der Bewegung nicht beeinträchtigt. Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter e Glasglocke gesetzt. Er bewegt sich ganz gut, auch mit dem linken Beine.
- h 15 m Der Frosch ist ganz munter. Er wird wieder auf d. Rücken aufgebunden. P = 27. Die Peristaltik ist kaum angedeutet. Diastole nicht ausgesprochen, aber langdauernd; Systole kurzdauernd, aber energisch. Der Goltz'sche Vers. von sehr ausgesprochenem Effect — 30 Sec. langer diastolischer Stillstand.
- h 15 m P = 16. Peristaltik nicht mehr vorhanden. Das Thier ist ganz munter. Abbruch.

Ergebniss: Characteristische und energische Digitalinwirkung kommt auch den Samenkapseln der *Digitalis gigantea* Fisch. zu. Die Wirkung derselben übertrifft diejenige der Blätter derselben Species an Intensität fast um das 3-fache, denn von den Blättern 0,15 g nöthig war, während von den Samenkapseln schon 0,05 g genügte um Wirkung hervorzurufen.

d. Stengel.

Versuch 45.

Kleine Temporalia von 30 g.

- 1 h 00 m P = 43
- » 03 m P = 45.
- » 05 m Injection von 1 ccm Stengel von *Digit. gigant.* Fisch. in den linken Oberschenkel.
- » 12 m P = 48. Systole energischer.
- » 20 m P = 46
- » 26 m P = 45
- » 35 m P = 46
- » 40 m Injection von 1 ccm Stengel in den rechten Oberschenkel.

1 h 45 m P = 47

» 52 m P = 42

2 h 08 m P = 40. Die Herzthätigkeit scheint sich fast gar nicht verändert zu haben. Athmung und Bewegungen der Glieder auch unverändert.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt. Er bewegt sich sehr energisch und bemüht sich von der Glocke sich zu befreien.

4 h 15 m Der Frosch wird wieder auf den Rücken aufgebunden
P = 37. Keine weitere Veränderungen.

» 25 m Injection von 1 ccm Stengel in den linken Oberschenkel

» 30 m Spontane Bewegungen des Frosches bewirken längere diastol. Stillstand des Herzens (Goltz!).

» 35 m P = 30

» 38 m Injection von 1 ccm Stengel in den rechten Oberschenkel.

» 44 m Die activen Bewegungen sind viel geringer geworden

» 50 m An der Herzthätigkeit keine weitere Veränderungen. Der Frosch athmet zwar, liegt aber abgebunden auf dem Brett ganz bewegungslos.

6 h 03 m P = 18. Die Schläge sind sehr schwach, ebenso die Athmung. Liegt auf dem Rücken ganz bewegungslos.

» 44 m In der Herzthätigkeit keine Veränderung. Athmung ungeheuer schwach. Active Bewegungen fehlen ganz, ebenso die electr. Erregbarkeit der Extremitäten

Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glasglocke gesetzt.

Nächster Tag.

10 h 10 m Der Frosch ist todt. Herzkammer und Vorhöfe in Diastole. Electr. Erregbarkeit fehlt vollständig. Es fällt besonders stark ausgeprägte Todtenstarre auf.

Ergebniss: Die Stengel von *Digitalis gigantea* Fisch scheinen von digitalinartig wirkenden Stoffen so gut wie gar nichts zu enthalten; dagegen die Muskulatur (und das Centralnervensystem?) lähmende Stoffe (Zersetzungsprodukte) sind wohl in denselben enthalten, wenn auch in relativ unerheblicher Quantität.

4. *Digitalis ferruginea* L.

Rostfarbener Fingerhut.

Blätter länglich-lancettlich und am Blattstiele ganz glatt. Stengel vielblüthig. Kelchblätter oval-elliptisch, stumpf, mit

lockenhäutigen Rändern, glatt. Krone am Rande wollig, untere Zipfel eiförmig. Mehrjährige Pflanze, in Armenien, Taurien, am Kaukasus, in Italien, Griechenland heimisch. Die Gestalt der Pflanze ist derjenigen der *Digitalis laevigata* fast ganz ähnlich. Die kleineren Blüthen bald sehr zahlreich und in langen dichten Ähren, bald weniger zahlreich und lockerer. Der Kelch ist während der Blüthezeit fast 3 Linien lang. Krone mit langer Röhre, die oberen Zipfel kurz, mit wolligen Rändern; untere Zipfel viel länger, oben dichthaarig, ungetheilt oder nicht deutlich in 3 Zähne getheilt¹⁾

Die Pflanze soll zu den schönsten *Digitalis*-arten gehören und in Italien statt des rothen Fingerhutes gebräuchlich sein. In Griechenland gilt sie im Volke als ein sicheres Mittel gegen Wasserscheu²⁾

a. Blätter *).

Versuch 46.

Kleine Temporaria von 27 g.

0 h 42 m P = 34

» 44 m Injection von 0,1 g fol. Digit. ferrugin. L in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.

1) *D. ferruginea* (Linn. spec. p. 867), foliis oblongo-lanceolatis caucaseae glaberrimis, racemo multifloro, calycis segmentis ovali-ellipticis obtusis mucoso-marginatis glabris, corollae limbo lanato lacinia infima ovata. 4 in Olympo Bithynico (Sibthorp, Aucher! n. 1788), in Armenia (Aucher!), Tauria (Steven!), Georgia Caucasica (Wilmsen!), in silvis Ghilan (Aucher! n. 5075) — Lindl. mon. t. 12. Bot. mag. t. 1828. Reichb. iconogr. bot. t. 156. Sibth. t. Sm. fl. gr. 7. t. 606. *D. aurea* Lindl. mon. t. 13. (quoad ic. *D. lutea* hortul. et *D. laevigata*). Habitus fere *D. laevigatae*. Flores minores nunc numerosissimi longe et densissime racemosi, nunc pauciores laxi. Calyx per anthesin fere 3 lin. longus. Corolla ferruginea tubo quam in *D. laevigata* duplo longiore, lacinii superioribus abbreviatis margine lanatis, infima multo longiore supra dense barbata, integra vel obscure sinuato-tridentata. De Candolle, a. O.

2) Rosenththal, Dr. D. A., Synopsis plantarum diaphoricarum. Systematische Uebersicht der Heil-, Nutz- und Giftpflanzen aller Länder. Erlangen 1862.

*) Von der einjährigen Pflanze waren nur Blätter zu sammeln.

- 10 h 46 m P = 39. Systole ausserordentlich energisch geworden. Andeutung von Peristaltik.
- » 50 m P = 38
- » 53 m P = 39. Schwache Peristaltik der Herzkammer Goltz's Vers. effectlos.
- » 55 m Die Peristaltik ist stärker. Herzspitze und Herzbasiswinkel werden während der Diastole blasenartig aufgebrochen.
- » 58 m P = 38
- 11 h 07 m P = 16; P der Vorh. = 40. Bald nach 3, bald nach 2 Vorhofscontractionen folgt eine Kammerdiastole.
- » 20 m Systolischer Stillstand der Herzkammer. Vorhöfpulsiren noch. Durch den Schmiedeberg'schen Versuch gelingt es die Kammer gewaltsam auszudehnen, sie contrahirt sich ein Paar Mal und kehrt wieder in systol. Stellung zurück. Die Athmung ist normal. Bewegungen der Glieder etwas schwächer, besonders die des linken Beines.
- » 28 m Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Bewegt sich sehr schwach. Linker Oberschenkel gelähmt.
- » 58 m Der Frosch liegt unter der Glocke ganz bewegungslos, das rechte Bein an den Leib angezogen, das linke gestreckt.
- 1 h 10 m Die Kammer systol. contrahirt, Vorhöfe pulsiren noch. Athmung erhalten. Bewegungen gering. Das rechte Bein beweglich, das linke gar nicht.
- Unterbrechung.
- 5 h 50 m Der Frosch ist todt. Herzkammer in Systole. Vorhöfe in Diastole. Todtenstarre stark ausgeprägt. Die ganze linke Seite ist für den electricischen Strom un-erregbar: sowohl das linke Vorderbein, als die linke Thorax- und Bauchseite, als auch das linke Hinterbein, während die entsprechenden Theile der rechten Seite ganz gut reagiren.
- Der Versuch ist beendet.

Versuch 47.

Kleine Temporaria von 35 g.

- 11 h 51 m P = 44
- » 52 m Injection von 0,05 g fol. Digit. ferrugin. L. in 1 cc Aq. in d. linken Oberschenkel.
- 12 h 03 m P = 36. Systole energischer und zugleich länger dauernd, auch die Diastole ist ausgiebiger.
- » 15 m Auf mehrere Vorhofscontractionen (3—6) folgt eine Kammerdiastole. Sonst ist die Kammer vorwiegend

stark systol. contrahirt und ganz blass. Athmung und Bewegungen normal.

- h 24 m Auf jede Vorhofscontraction folgt jetzt wieder nur eine Kammerdiastole. Starke Peristaltik.
- » 29 m Zeitweiliger systol. Stillstand der Kammer, Vorhöfe pulsiren noch, $P = 32$.
- » 34 m Durch den Schmiedeberg'schen Versuch gelingt es gewaltsam die Kammer zu dilatiren, worauf sie wieder zu pulsiren beginnt.
- » 38 m Während der Diastole wird nur die hintere Kammerwand dilatirt, die vordere bleibt in ihrer systol. Stellung zurück, die Spitze wird durch die Dilatation der hinteren Wand nach vorn gedrängt, die vordere Wand daher nach vorn concav.
- » 49 m Derselbe Contractionsmodus der Kammer, nur folgt auf zwei Vorhofscontractionen nur eine Kammerdiastole.
- h 13 m Dauernde Kammersystole, Vorhöfe pulsiren noch. Athmung und Bewegungen schwächer.
- » 16 m Durch den Schmiedeberg'schen Vers. gelingt es wohl d. Kammer zu dilatiren, sie contrahirt sich aber nach d. Nachlassen des Druckes gleich wieder und verbleibt systol. contrahirt, die Vorhöfe pulsiren weiter.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt.

- h 15 m Der Frosch athmet und bewegt sich, wenn auch schwächer. Der linke Oberschenkel ist gelähmt. Spitze und vordere Wand der Kammer systol. contrahirt, hintere schlaff. Die Vorhöfe pulsiren. Durch den Schmiedeberg'schen Vers. wird die Kammer stark mit Blut gefüllt, worauf sie einige Contractionen macht und wieder in die frühere Stellung zurückkehrt.
- » 40 m Vorhöfe und Kammer stehen still. Auf Berührung des Herzens mit d. Pincette fängt dasselbe zu pulsiren an, wobei aber nur Spitze und hintere Wand sich dilatiren. Nach einigen Schlägen stehen Kammer u. Vorhöfe wieder still. Athmung und active Bewegungen sehr schwach.
- h 38 m Herzkammer befindet sich in Mittelstellung, Vorhöfe schlaff. Ab und zu erfolgt eine schwache Contraction der Kammer. Athmung und Bewegungen schwach. Unterbrechung.

Nächster Tag.

- h 25 m Der Frosch ist todt. Herzkammer in Systole, Vorhöfe in Diastole. Todtenstarre linkerseits viel stärker ausgeprägt, als rechterseits. Electriche Eerregbarkeit erloschen.

Versuch 48.

Kleine Temporaria von 24 g.

10 h 59 m $P = 52$

11 h 05 m Injection von 0.025 g fol. Digit. ferrugin. L. in cem Aq. in den linken Oberschenkel.

» 10 m $P = 57$. Systole energischer. Schwache Andeutung von Peristaltik in der Diastole.

» 13 m $P = 57$. Schwache Peristaltik der Kammer in der Diastole.

» 18 m $P = 55$. Einige Schläge waren in der Diastole von stark peristalt. Natur, der rechte Winkel der Basis wurde blasenartig aufgetrieben, bald aber blieb derselbe Winkel systol. contrahirt, und nur der übrige Theil des Herzens erschlaffte während der Diastole.

» 23 m $P = 55$. Sehr starke Peristaltik der Herzkammer.

» 28 m Auf 2 Vorhofsecontractionen folgt nur eine Kammerdiastole.

» 40 m $P = 25$. P der Vorhöfe = 50. Die Herzspitze ist dauernd contrahirt, und in der Diastole erschlafft nur die Basis.

11 h 53 m Auf mehrere Vorhofsecontractionen folgt nur eine Kammerdiastole.

12 h 15 m Die Kammer ist fast in dauernder Systole verharrt, die Diastole ist von sehr kleiner Excursion.

» 30 m Die Herzkammer ist dauernd systol. contrahirt. Vorhöfe pulsiren noch, P der Vorh. = 14. Durch die Schmiedeberg'schen Vers. gelingt es wohl die Kammer mit Blut zu füllen, aber nach dem Nachlassen des Druckes contrahirt sich dieselbe systolisch wieder. Athm. und Bewegungen normal.

» 38 m Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Hüpfte unter der Glocke munter umher. Beide Beine gleich gut beweglich.

1 h 40 m Der Frosch ist todt. Herzkammer in Systole, Vorhöfe in Diastole. Electriche Erregbarkeit ist im linken Hinterbeine einwenig schwächer als im rechten, die Vorderseite (hier wurde die Injection gemacht) des linken Oberschenkels ist ganz unerregbar, ebenso die linke Thorax- und Abdomenseite.

Versuch 49.

Kleine Temporaria von 39 g.

5 h 15 m $P = 48$

» 19 m $P = 50$

- h 21 m P = 50
 » 24 m Injection von 0,01 g fol. Digit. ferrugin. L. in 1 cem Aq. in den linken Oberschenkel.
 » 27 m P = 52. Systole ausgesprochener und länger.
 » 35 m P = 52. Diastole an Ausgiebigkeit abgenommen.
 44 m P = 52
 » 49 m Andeutung von Peristaltik der Kammer.
 » 52 m Systole noch energischer.
 h 00 m P = 49
 12 m P = 47
 » 22 m P = 47. Die Diastole wieder gut ausgesprochen.
 55 m P = 43

Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glasglocke gesetzt, wobei er sich ganz normal verhält.

Nächster Tag.

- h 05 m Der Frosch sitzt unter d. Glocke, Rumpf und Kopf aufgerichtet. Beim Anfassen — energische Bewegungen. Das Thier hat sich ersichtlich ganz erholt.
 Abbruch.

Versuche 46, 47, 48 und 49 ergeben:

- 1) dass der rostfarbene Fingerhut ganz typisch digitalinartig wirkt;
- 2) dass die Wirkungsintensität des rostfarbenen Fingerhutes diejenige aller bisher untersuchten Digitalisarten weitaus übertrifft. Sogar den rothen Fingerhut übertrifft der rostfarbene circa um das 10-fache.

Bei solcher Wirkungsintensität, wie sie der rostfarbene Fingerhut entfaltet, kann man fast schon von einer Annäherung an die Wirkungsintensität der reinen wirksamen Bestandtheile der Digit. purpurea sprechen, denn 2 ctg fol. Digitalis ferrugin. wirken ebenso stark wie 1 mg Digitalein Merck — also das Digitalein wirkt nur 20 Mal stärker als die Drogue! Es ist daher interessant, die Wirkung an einem Warmblüterorgane (Rindsniere) in einem Durchströmungsversuche vergleichsweise zu beobachten, zumal wir die Wirkung des Digitaleins an einem derartigen Versuche bereits beobachtet hatten.

Versuch 50.**Durchströmungsversuch.**

Dieselbe Versuchsanordnung wie im Versuche 16.

T.		Q.		Bemerkungen.
3 h	14 m —	60 + 30	= 90 ccm.	Manometerdruck = 50.
»	15 m —	70	= 40 ccm.	
»	16 m —	100	= 30 ccm.	
»	17 m —	120	= 20 ccm.	
»	18 m —	146	= 26 ccm.	
»	19 m —	166	= 20 ccm.	
»	20 m —	18	= 18 ccm.	
»	21 m —	36	= 18 ccm.	
»	22 m —	60	= 24 ccm.	Drucksteigerung bis auf 70.
»	23 m —	100	= 40 ccm.	
»	24 m —	136	= 36 ccm.	
»	25 m —	32	= 32 ccm.	
»	26 m —	90	= 58 ccm.	
»	27 m —	136	= 46 ccm.	
»	28 m —	10 + 34	= 44 ccm.	
»	29 m —	60	= 50 ccm.	
»	30 m —	104	= 44 ccm.	
»	31 m —	46 + 10	= 56 ccm.	20 mg fol. Digit. Ferrugin.*) + 100 ccm Blut.
»	32 m —	44	= 34 ccm.	Normal.
»	33 m —	64	= 20 ccm.	
»	34 m —	84	= 20 ccm.	
»	35 m —	102	= 18 ccm.	
»	36 m —	118	= 16 ccm.	
»	37 m —	135	= 17 ccm.	
»	38 m —	154	= 19 ccm.	
»	39 m —	177	= 23 ccm.	
»	40 m —	194	= 17 ccm.	
»	41 m —	16	= 16 ccm.	
»	42 m —	34	= 18 ccm.	
»	43 m —	64	= 30 ccm.	Steigerung d. Druckes bis auf 90.
»	44 m —	100	= 36 ccm.	
»	45 m —	130	= 30 ccm.	
»	46 m —	16	= 35 ccm.	
»	47 m —	62	= 47 ccm.	Dasselbe Gift.
»	48 m —	90	= 20 ccm.	Normal.

*) Das Lösliche aus 20 mg in 2 ccm physiol. ClNa-Lösung.

T.				Q.	Bemerkungen.
3 h	49 m	—	22	= 22 ccm.	Normal.
»	50 m	—	42	= 20 ccm.	
»	51 m	—	62	= 20 ccm.	
»	52 m	—	82	= 20 ccm.	
»	53 m	—	102	= 20 ccm.	
»	54 m	—	120	= 18 ccm.	
»	55 m	—	146	= 26 ccm.	Dasselbe Gift.
»	56 m	—	22	= 22 ccm.	
»	57 m	—	36	= 14 ccm.	Normal.
»	58 m	—	51	= 15 ccm.	
»	59 m	—	62	= 11 ccm.	
4 h	00 m	—	71	= 9 ccm.	
»	01 m	—	6	= 6 ccm.	
»	02 m	—	16	= 10 ccm.	
»	03 m	—	24	= 8 ccm.	
»	04 m	—	42	= 18 ccm.	Steigerung des Druckes
»	05 m	—	60	= 18 ccm.	allmählig bis auf 120
»	06 m	—	78	= 18 ccm.	mm Hg.
»	07 m	—	94	= 16 ccm.	
»	08 m	—	112	= 18 ccm.	
»	09 m	—	144	= 32 ccm.	
»	10 m	—	16 + 6	= 22 ccm.	
»	11 m	—	30	= 24 ccm.	•
»	12 m	—	50	= 20 ccm.	
»	13 m	—	72	= 22 ccm.	
»	14 m	—	92	= 20 ccm.	
»	15 m	—	112	= 20 ccm.	
»	16 m	—	132	= 20 ccm.	
»	17 m	—	152	= 20 ccm.	
»	18 m	—	170	= 18 ccm.	
»	19 m	—	186	= 16 ccm.	
»	20 m	—	4 + 14	= 18 ccm.	100 mg fol. Digit. fer-
»	21 m	—	30	= 26 ccm.	rugin. + 100 ccm Blut.
»	22 m	—	48	= 18 ccm.	Normal
»	23 m	—	60	= 12 ccm.	
»	24 m	—	70	= 10 ccm.	
»	25 m	—	78	= 8 ccm.	
»	26 m	—	86	= 8 ccm.	
»	27 m	—	94	= 8 ccm.	
»	28 m	—	102	= 8 ccm.	
»	29 m	—	108	= 6 ccm.	
»	30 m	—	112	= 4 ccm.	Abbruch.

Der Versuch ergibt, dass der Infus des rostfarbenen Fingerhutes sowohl in der Concentration von 1 : 5000 als auch in der Concentration von 1 : 1000 zunächst und zwar bald nach der Application die Blutstromgeschwindigkeit der Niere steigert resp. die Nierengefäße erweitert, bald aber darauf das Umgekehrte bewirkt — die Blutstromgeschwindigkeit der Niere secundär herabsetzt resp. die Nierengefäße secundär verengt und dies bei nur 1 oder höchstens 2 Minuten lang dauernder Einwirkung des Giftes. Wenn wir uns überlegen, dass in den Infus wohl größtentheils das in H_2O lösliche Digitalein übergeht, so ist uns diese Erscheinung im Versuche klar. Vgl. Versuch 15. Neulich fand Zotos¹⁾, dass auch Cerberin die Nierengefäße primär erweitert, um später dieselben zu verengen. Zur besseren Orientirung über den primären Einfluss von Digitoxin und Digitalein auf die Nierengefäße lege ich nachfolgende Tabelle von Prof. Kobert²⁾ bei, wo nur Nierendurchströmungen angeführt werden und wo auch die procentische Zusammenstellung der Resultate meiner Nierendurchströmungen mit Infus. fol. Digit. ferrugin. zu finden ist. Siehe Tab. I. •

Tabelle I.

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
N ^o des Versuchsprotocolls.	Thierart.	Pharmakologisches Agens.	Pro Mille-Gehalt des Blutes an III.	Dauer der Einwirkung in Minuten	Erzielte Veränderung der Ausflusgeschwindigkeit in Procenten.	Durchgeströmte absolute Menge von III in Mgr.	Bemerkungen.
104	Schwein	Digitoxin	0,030	3	+ 177	2,2	Kobert's u. Thomson's Versuche.
105	«	«	0,004	5	+ 5	0,04	
106	«	«	0,020	5	+ 9	1,84	
107	Schaf	«	0,033	2	+ 75	0,4	

1) Zotos, Z. N., a. a. O. p. 31.

2) Kobert, R., Critical Observations and Experimental Studies, on the Influence of Pharmacological Agents on Peripheral Vessels — by Prof. R. Kobert. Reprinted from the therapeutic Gazette for June 1887, pag. 4.

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
% des Ver- suchsprotocolls.	Thierart	Pharmako- logisches Agens.	Pro Mille-Ge- halt des Blu- tes an III.	Dauer der Ein- wirkung in Minuten.	Erzielte Ver- änderung der Ausflusse- geschwindigkeit in Procenten.	Durchgeströmte absolute Menge von III. in Mgr.	Bemer- kungen.
108	Ochse	Digitoxin	0,016	7	+	15	1,0
109	«	»	0,032	4	+	20	6,0
110	Schaf	Digitalein	0,016	2	+	12	1,1
111	«	»	0,010	4	+	14	1,2
112	«	»	0,016	4	+	27	1,6
113	«	»	0,016	3	+	28	2,0
114	«	»	0,009	3	+	17	1,3
115	Schwein	»	0,020	2	+	66	1,1
116	«	»	0,020	2	+	88	1,9
117	Hund	»	0,333	4	+	24	20,0
118	«	»	0,333	2	+	50	10,0
119	«	»	0,333	4	+	50	10,0
120	Ochse	»	0,166	7	+	30	18,0
121	«	»	0,083	3	+	13	11,0
} Kobert's und Thomson's Versuche.							
50	Rind	Fol. D. ferrug. L.	0,200	1	+	28	11,20
»	«	»	0,200	1	+	28	9,40
»	«	»	0,200	2	+	27	9,60
»	«	»	1,000	2	+	27	44,00
} Eigene Versuche.							

Versuch 51.

Kröte (*Bufo vulgaris*) von 45 g.

Bekommt eine Injection von 0,04 g fol. Digital. ferrugin.

L. gelöst in 1 ccm Aq. unter die Haut des Rückens.

4 h 45 m Verhält sich ruhig unter der Glasglocke.

» 50 m Athmet normal, klettert an der Wand des Glases.

5 h 00 m Status idem.

» 08 m Status idem.

» 10 m Aufgebunden auf den Rücken. Fensterschnitt, Herz vorgestülpt aus dem eröffneten Herzbeutel.

» 20 m P = 52. Herz schlägt ganz normal.

» 24 m P = 54. Systole bedeutend länger als die Diastole.

» 30 m Injection von 0,1 g fol. Digit. ferrugin. L. in 1 ccm Aq. in der linken Oberschenkel.

» 34 m P = 48. Diastole ausgesprochener. Goltz'scher Versuch ohne Erfolg.

5 h 45 m P = 45. Normaler Herzschlag. Auch Athmung und Bewegungen der Glieder normal.

6 h 00 m Status idem.

7 h 00 m Das Thier verhält sich ganz normal.

Abbruch, das Thier wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt. Bewegt sich munter.

Ergebniss: Eine relativ kolossale Menge des Giftes bewirkte an der Kröte absolut keine Veränderung. Die Beobachtung der Autoren, dass die Digitalinstoffe auf die Kröte nicht einwirken, findet demnach ihre volle Bestätigung auch in Bezug auf den rostfarbenen Fingerhut.

b. Samen.*)

Versuch 52.

12 h 43 m P = 28

12 h 45 m Injection von 0,01 g sem. Digit. ferrugin. in 1 cem Aq. in den linken Oberschenkel. Sofort nach der Injection wird die Diastole ausgiebiger, die Systole energischer.

» 50 m P = 30. Systole sehr energisch. Diastole normal.

» 53 m P = 38

» 56 m P = 38

1 h 12 m P = 36. Diastole kleiner.

» 22 m P = 36

» 27 m Injection von 0,01 g sem. Digit. ferrugin. L. in 1 cem Aq. in den linken Oberschenkel.

» 29 m P = 39

» 37 m P = 49

» 45 m Andeutung von Peristaltik.

» 50 m P = 33. Peristaltik der Herzkammer.

» 55 m P = 38. Der Ventrikel zeigt die Neigung überhaupt in Systole zu verbleiben; Diastole sehr klein und von schwacher Peristaltik begleitet.

2 h 00 m Auf 2 Vorhofscontractionen folgt nur eine Ventrikeldiastole.

» 10 m Auf mehrere Vorhofscontractionen (8—10) folgt nur eine Kammerdiastole, in den Zwischenpausen systolischer Stillstand der Kammer. In Bezug auf Athmung und Bewegungen der Glieder Alles normal.

» 18 m P = 22. Vorhof und Kammer pulsiren wieder gleichzeitig, aber Kammerdiastole ist uugemein klein; di

*) Stammen aus einer im botanischen Garten zu St.-Petersburg gezogenen Pflanze.

Kammer sieht aus, als ob sie in permanenter Systole verharrte, und nur bei genauerem Zusehen bemerkt man die kleine Diastole.

Unterbrechung.

Am folgenden Tage wird das Thier völlig erholt gefunden. Abbruch.

Wir ersehen aus dem Versuche, dass die Samen der *D. arrugin.* in Bezug auf Intensität der Wirkung ungefähr den Blättern gleichzukommen scheinen, was man auf Grund der Untersuchungen der vorigen Drogen eigentlich nicht erwarten sollte, denn stets sahen wir die Samen um das Mehrfache stärker wirken als die bezüglichen Blätter. Die hier scheinbar vorkommende Ausnahme mag auf dem Umstande beruhen, dass die Blätter und Samen nicht von derselben Droge stammen.

5. *Digitalis eriostachys.*

Blätter.

Versuch 53.

Mittelgrosser Frosch.

- 2 h 20 m P = 46
 » 25 m Injection von 0,05 g fol. *Digit. eriostachys* in 1 ccm Aq. in d. linken Oberschenkel.
 » 27 m P = 44
 » 35 m P = 44. Diastole sehr gering, Systole bedeutend ausgesprochen und lang. Das Herz zeigt überhaupt die Neigung in Systole zu verbleiben.
 » 40 m P = 47. Auf Goltz's Vers. 20 Sec. langer diastol. Stillstand. Diastole ungeheuer klein.
 » 53 m P = 38
 1 h 23 m P = 22
 » 34 m P = 24. Athmung und Bewegungen schwächer. Linker Oberschenkel weniger beweglich als rechter.

Unterbrechung.

Der Frosch wird unter die Glasglocke gesetzt. Bewegungen sind geringer geworden.

- 4 h 30 m Der Frosch ist todt, Herzkammer in ausgesprochener Diastole, ebenso die Vorhöfe. Electr. Erregbarkeit erhalten, im linken Beine ist dieselbe schwächer als im rechten; im linken Oberschenkel, besonders an der Vorderseite, fehlt sie ganz.

Versuch 54.

Kleine Temporaria von 44 g.

5 h 00 m P = 48

» 03 m P = 48

» 05 m Injection von 0,05 g fol. Digit. erio-stachys in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.

» 11 m P = 47

» 58 m P = 39

6 h 02 m Da sich nichts geändert hat, so wird noch 0,05 g fol. Digit. erio-stachys in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel injicirt.

» 06 m P = 41

» 14 m P = 42

» 18 m Der linke Oberschenkel wird massirt, die Injectionsflüssigkeit nach dem Rumpfe getrieben.

» 20 m Systole energischer. Andeutung von Peristaltik der Kammer. Massage wiederholt.

» 21 m Deutliche Peristaltik der Kammer.

» 25 m P = 45. Ungeheuer starke Peristaltik. Bald wird die Spitze, bald die Basis der Kammer blasenartig aufgetrieben.

» 32 m P = 40. Peristaltik dauert fort.

» 39 m P = 40

» 55 m Athmung und Bewegungen normal.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Er bewegt sich normal.

Nächster Tag.

6 h 06 m P = 42. Die Herzspitze befindet sich in permanenter diastol. Erschlaffung und theilnimmt an den Pulsationen nicht, nur die Basis contrahirt sich. Sonst Alles normal.

Nächster Tag.

11 h 45 m P = 46. Dasselbe Verhalten des Herzens wie gestern. Sonst Alles normal.

6 h 30 m P = 40. Die Pulse sind klein. Herzspitze permanent diastol. erschlafft, theilnimmt an den Pulsationen nicht. Die activen Bewegungen sind träge, der Frosch vermag sich nicht vom Rücken auf den Bauch umzuwenden. Eine gewisse Gliederstarre macht sich bemerkbar. Athmung schwächer.

Abbruch.

Die Versuche 53 und 54 ergeben, dass die Digitalis erio-stachys wohl digitalinartig zu wirken scheint, zeigt aber nur g

ge Wirkungsintensität, wohl geringere als diejenige der *Digitalis purpurea*. Hervorzuheben wäre noch das Vorwiegen der Diastole in den vorgerückten Stadien der Vergiftung.

6. *Digitalis Fontanesii* Steud.

Blätter.

Versuch 55.

Kleine Temporaria von 44 g.

- 5 h 00 m P = 52
 » 03 m P = 52
 » 05 m P Injection von 0,05 g fol. *Digital. Fontanesii* in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.
 » 09 m P = 55
 » 13 m P = 53
 » 18 m P = 54
 » 24 m P = 54. Diastole auffallend kleiner geworden, Systole energisch.
 » 29 m Andeutung von Peristaltik der Kammer.
 » 30 m P = 52
 » 35 m Injection von 0,05 g fol. *Digit. Fontanesii* Steud. in den rechten Obersch.
 » 40 m P = 50
 » 45 m Andeutung von Peristaltik.
 6 h 00 m P = 40
 » 08 m Injection von 0,05 g fol. *Digital. Fontanesii* Steud. in den linken Obersch.
 » 13 m P = 37
 » 18 m P = 35
 » 25 m P = 31
 » 37 m P = 35

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glocke gesetzt. Er bewegt sich energisch.

Nächster Tag.

- 10 h 52 m Der Frosch wird wieder auf den Rücken aufgebunden. Athm. normal. Bewegungen träge.
 » 56 m P = 66. Normale Pulse.
 11 h 10 m P = 44.
 » 21 m Injection von 0,05 g fol. *Digital. Fontanesii* in 1 ccm Aq. in den linken Obersch.
 » 27 m P = 42
 » 31 m P = 43. Andeutung von Peristaltik der Kammer.
 » 33 m Ganz deutliche Peristaltik der Kammer.
 » 48 m P = 28. Peristaltik dauert fort.

12 h 09 m $P = 28$. Diastole sehr klein, Systole energisch. Während derselben werden Herzspitze und Basisecken blasenartig aufgetrieben. Athmung gut, Bewegungen der Glieder herabgesetzt.

» 37 m $P = 29$. Diastole ungeheuer klein, Systole energisch und lange. Während derselben wird die Spitze blasenartig aufgetrieben.

1 h 26 m $P = 25$. Sowohl Diastole wie Systole von geringer Ausgiebigkeit. Während der Systole blasenartige Auftreibung der Herzspitze. Athmung normal. Bewegungen der Glieder träge.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Bewegt sich träge.

5 h 10 m $P = 25$. Die Ausgiebigkeit der Pulsationen ist wieder grösser geworden, ähnlich der eines normalen Froschherzens. Peristaltik verschwunden. Athmung und Bewegungen der Glieder schwach.

Nächster Tag.

11 h 45 m Der Frosch ist todt. Die linke Seite der Herzkammer ist systol. contrahirt, die rechte ausgesprochen diastolisch, ebenso die Vorhöfe. Electr. Erregbarkeit der Muskeln fast vollständig erloschen.

Versuch 56.

Kleine Temporaria von 42 g.

5 h 40 m $P = 39$

» 42 m Injection von 0,1 g fol. Digital. Fontanesii Steud. in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.

» 45 m $P = 45$

» 47 m Massage des linken Oberschenkels.

» 50 m $P = 44$. Systole energischer, Diastole kleiner.

» 55 m $P = 47$

6 h 00 m $P = 44$

» 03 m Injection von 0,1 g fol. Digital. Fontanesii Steud. in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.

» 5 m $P = 36$

» 9 m $P = 35$

6 h 24 m $P = 38$. Sehr kleine Excursionen der Kammercontractionen.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Er bewegt sich normal. Auch Athmung normal.

2. Tag.

11 h 10 m $P = 32$. Der Frosch liegt auf dem Rücken ganz bewegungslos. Athmung schwächer als normal. D.

Herzpulsationen sind sehr ausgiebig, sowohl die systol. als namentlich auch die diastolischen. Auf leichte Hautreize tritt längerer diastol. Stillstand ein.

- h 30 m P = 28. Bei electr. Reizung der hinteren Extremitäten bei RA = 0 erweisen sich dieselben fast ganz unerregbar, dagegen zucken dabei die vorderen Extremitäten und der obere Theil des Rumpfes.
- h 00 m P = 26. Active Bewegungen wieder an allen Extremitäten eingetreten. Athmung normal. Herzthätigkeit der eines normalen Froschherzens entsprechend. Der Frosch scheint sich überhaupt erholt zu haben. Leichte Hautreize bewirken einen längeren diastol. Stillstand.
- h 15 m P = 43. Keine weitere Veränderungen. Herzpulsation normal.
- 25 m P = 47. Auf d. Rücken aufgebunden.
- 32 m Injection von 0,1 g. fol. Digit. Fontanesii Steud. in 1 ccm Aq. in d. linken Oberschenkel.
- 35 m Systole energischer.
- 38 m P = 41
- 45 m Peristaltik der Kammer.
- 49 m P = 36. Spitze und Basisenden werden in der Systole blasenartig aufgetrieben. Systole sehr energisch.
- 54 m P = 30. Peristaltik stärker geworden.
- h 43 m P = 22

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden, und unter Glasglocke gesetzt. Bewegt sich normal.

3. Tag.

- h 55 m Der Frosch wird vollständig athmungs- und bewegungslos gefunden. Herzkammer contrahirt sich in grossen Intervallen und sehr schwach.
- h 10 m Der Frosch ist todt. Herzkammer in Mittelstellung zwischen Systole und Diastole.

Versuche 55 und 56 ergeben, dass Digitalis Fontanesii Steud. von digitalinartig wirkenden Stoffen wohl nur ganz wenig enthält.

7. Digitalis glandulosa.

a. Blätter.

Versuch 57.

Mittelgrosse Temporaria von 44 g.

- h 40 m P = 45
- » 45 m Injection von 0,05 g fol. Digital. glandulosae in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.
- » 50 m P = 48

- 10 h 52 m P = 50. Systole ausserordentlich energisch. Andertung von peristalt. Bewegungen der Kammer.
- » 55 m P = 46
- 11 h 00 m P = 50
- » 04 m P = 50. Systole sehr energisch und langdauernd. Diastole klein und kurzdauernd. Die Kammer ist zusammengeschrumpft, auf derselben sind warzenförmige scheinbar mit Blut gefüllte Gebilde zu sehen (geschrumpfte Kammerwandhöhlen?)
- » 15 m P = 52
- » 22 m P = 51. Das Herz ist in seiner Grösse auf die Hälfte gegen das Normale reducirt.
- » 30 m P = 51
- » 41 m P = 50. Diastole wieder ausgiebiger.
- » 45 m Injection von 0,05 g fol. Digital. glandulosae in 1 ccm Aq. in den rechten Oberschenkel.
- » 47 m P = 50. Angedeutete Peristaltik d. Kammer.
- » 50 m P = 50
- » 60 m P = 47
- 12 h 08 m Injection von 0,05 g Dig. glandul.
- » 12 m P = 48
- » 15 m Deutliche, aber schwache Peristaltik.
- » 20 m P = 41. Ganz deutliche stärkere Peristaltik der Kammer.
- » 30 m P = 13. Starke Peristaltik.
- » 55 m Peristaltik dauert fort. Athmung und Bewegungen der Glieder schwächer.
- 1 h 15 m Diastole klein. Peristaltik schwächer.
- Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glasglocke gesetzt.
- 5 h 30 m Der Frosch ist ganz bewegungs- und athmungslos auf mechan. Reize reactionslos. Die Herzkammer zeigt höchst unregelmässige peristalt. Bewegungen.
- » 49 m Nach kräftigem mechan. Reize macht der Frosch einige Athembewegungen.
- 6 h 00 m Für electr. Reize bei RA = 0 erweist sich der linke Oberschenkel und die Vorderseite des rechten Oberschenkel ganz unerregbar; die übrigen Glieder sind nur sehr schwach erregbar.

Unterbrechung.

Nächster Tag.

- 5 h 00 m Der Frosch ist todt; Kammer in Mittelstellung zwischen Systole und Diastole.

Ergebniss: Die Blätter von Digitalis glandulosa wirken sicher digitalinartig, die Wirkung ist aber von relativ geringer Intensität, jedenfalls schwächer als die der Digitalis purpurea.

b. Samen.

Versuch 58.

Mittelgrosse Temporaria von 31 g.

- 55 m P = 46
 58 m Injection von 0,05 g sem. Digital. glandulosae in 1 ccm Aq. in d. linken Oberschenkel.
 00 m P = 50
 07 m P = 49
 13 m P = 48. Systole sehr energisch. Andeutung von Peristaltik der Kammer. Goltz's Vers. erfolglos.
 15 m Deutliche Peristaltik der Kammer.
 19 m Nach spontaner Bewegung 30 Sec. langer diastol. Stillstand des Herzens. Herzspitze dauernd contrahirt, nur die Basis pulsirt.
 23 m P der Vorhöfe = 47. Auf mehrere Vorhofscontractionen folgt nur eine Kammerdiastole von sehr geringer Ausdehnung.
 30 m P = 38. Die Kammer ist fast vollständig und dauernd contrahirt, die diastol. Excursionen sind ungeheuer klein.
 15 m Stillstand der Kammer in Systole, der Vorkammer in Diastole. Der Schmiedeberg'sche Versuch bewirkt einige Schläge der Kammer, worauf dieselbe wieder still steht. Athmung und Bewegungen der Glieder normal.
 22 m Die Vorhöfe haben wieder zu schlagen angefangen; auf mehrere Vorhofscontractionen folgt eine Ventrikeldiastole.
 33 m Das Herz hat wieder angefangen regelmässig, aber langsam zu pulsiren.
 Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glasglocke gesetzt. Er bewegt sich ganz normal.

Nächster Tag.

- 58 m P = 49. Der Frosch verhält sich in jeder Hinsicht normal, die Herzthätigkeit nicht ausgenommen.
 Abbruch.

Versuch 59.

Mittelgrosse Temporaria von 47 g.

- 50 m P = 34
 58 m P = 32
 04 m P = 32
 09 m Injection von 0,02 g sem. Digit. glandulosae in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.

1 h 18 m P = 37. Die Systole ist ausserordentlich energisch geworden, auch länger dauernd als früher.

» 25 m P = 37

» 35 m Systole ebenso energisch, Diastole ausgiebiger geworden.

2 h 10 m P = 35

» 20 m Injection von 0,01 g sem. Digit. glandulosae in 0,1 ccm Aq. in d. rechten Oberschenkel.

» 27 m P = 38. Diastole sehr klein geworden.

» 34 m P = 35

Unterbrechung. Der Frosch wird unter die Glasglocke gesetzt. Er verhält sich ganz normal.

Nächster Tag.

12 h 00 m Das Thier hat sich ganz erholt. Injection von 0,1 sem. Digital. glandulosae in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel. Nach 37 Minuten erfolgt dauernder systolischer Stillstand der Kammer, wobei aber die Vorhöfe noch fort pulsiren. Athmung und Bewegungen der Glieder träge. Linkes Bein gelähmt. Am folgenden Tage wird das Thier todt angetroffen. Die ganze linke Körperhälfte erweist sich für den electrischen Strom unerregbar.

Versuch 58 und 59 zeigen, dass den Samen von Digitalis glandulosa wohl eine stärkere Wirkungsintensität zukommt als den Blättern. Die Samen wirken beinahe ebenso energisch wie diejenigen von Digitalis purpurea.

c. Samenkapseln.

Versuch 60.

Mittelgrosse Temporaria von 49 g.

12 h 30 m P = 50

» 35 m P = 50

» 40 m P = 50

» 42 m Injection von 0,1 g caps. sem. Digit. glandulosae in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.

» 45 m P = 56

» 47 m P = 55

» 50 m P = 55

» 53 m P = 54. Diastole kleiner, Systole energischer.

1 h 00 m P = 53

» 05 m P = 52

- 01 08 m Injection von 0,1 g caps. sem. Digit. glandul. in 1 ccm Aq. in den rechten Oberschenkel.
 10 m Andeutung von Peristaltik der Kammer.
 15 m Peristaltik der Kammer.
 50 m Stark ausgesprochene Peristaltik.
 07 m P = 18. Diastole klein, Systole energisch. Ab und zu schwache Peristaltik. Athmung und Bewegungen schwach.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter Glocke gesetzt. Die Athmung ist normal, die Bewegungen ge.

Nächster Tag.

- 00 m Der Frosch ist todt. Herzkammer in ausgesprochenster Systole.

Der Versuch ergibt, dass die Samenkapseln von Digitalis glandulosa ungefähr ebenso stark wirken, wie die Blätter derselben Art.

d. Stengel.

Versuch 61.

Grosse Temporaria von 64 g.

- 45 m P = 42
 53 m P = 39
 59 m P = 40
 00 m Injection von 1 g stipites Digital. glandulosae in 1 ccm Aq. in den linken Oberschenkel.
 03 m P = 44
 07 m P = 45. Systole energischer.
 15 m P = 49
 20 m P = 52
 23 m Injection von 1 g Stengel.
 30 m P = 54
 43 m P = 51
 49 m P = 50
 55 m P = 47. Die Herzkammer ist geschrumpft, die Excursionen klein.
 58 m Injection von 1 g Stengel.
 00 m P = 48
 10 m P = 43
 22 m P = 41. Peristaltik der Kammer; in der Systole wird die Spitze blasenartig aufgetrieben. Athmung und Bewegungen der Glieder normal.

6 h 30 m P = 40. Status idem.

» 34 m Injection von 1 g Stengel.

» 35 m Peristaltik besser ausgeprägt.

» 36 m P = 38. Starke wurmförmige, von der Basis zur Spitze fortschreitende, Peristaltik. Athmung und Bewegungen der Glieder normal.

» 43 m Zeitweilig hört die Peristaltik auf, um später wieder aufzutreten.

» 49 m P = 25. Unregelmässige und arrhythmische, dabei peristaltisch erfolgende, Contractionen der Herzkammer.

Unterbrechung. Der Frosch wird abgebunden und unter die Glasglocke gesetzt. Die Bewegungen sind sehr träge.

Nächster Tag.

12 h 30 m Der Frosch ist todt. Herzkammer in Diastole. Electrische Erregbarkeit fehlt vollständig. Die entblößten Muskeln zeigen bei directer Reizung schwache Zuckungen, bei Reizung aber vom Rückenmark und Nerven aus — keine Zuckungen. Curareartige Lähmung?

Abschluss.

Die Stengel von *Digitalis glandulosa* enthalten ebenso wie diejenigen der anderen Arten nur Spuren von digitalinartig wirkenden Stoffen.

III. Zusammenfassung der Ergebnisse.

1) Digitalein Merck sowie die von mir untersuchten *Digitalisspecies* bewirken am Frosch kurz nach der Application meist eine Pulsbeschleunigung und erst in einem vorgerückten Stadium der Giftwirkung (peristaltischen) eine Pulsverlangsamung.

2) Digitalinstoffe versetzen die peripheren Abschnitte des Vagus relativ früh in einen Zustand erhöhter Reizbarkeit. Viel später folgt ein Stadium der Lähmung dieses Nerven.

3) Peristaltische Bewegungen der Herzkammer am Frosch sind ebenso für Digitalinwirkung charakteristisch wie den peristaltischen Bewegungen meist folgender systolischer Herzkammerstillstand.

4) Herzperistaltik sowie selbst systolischer Ventrikelstillstand können beim Frosch rückgängig werden.

5) Digitalein sowie Digitalisinfus wirken an Warmblütern auf die Gefäße der Niere zunächst erweiternd, bald nachher verengernd ein.

6) Die in Wasser schwer resp. gar nicht löslichen Digitalisbestandtheile, Digitalin und Digitoxin, sind in Wasser bei Gegenwart von Digonin, weniger bei Gegenwart von Digitalein, besonders aber in eiweisshaltigen Flüssigkeiten, indem sie mit dem Eiweiss eine chemische Verbindung einzugehen scheinen, unlöslich.

7) Die reinen wirksamen Digitalisbestandtheile, ganz besonders Digitoxin, sind ausgesprochene Muskelgifte, die zunächst den Muskel vom Nerven aus in einen Zustand erhöhter Reizbarkeit versetzen, dann aber denselben rasch abtöden.

8) Von den käuflichen Merck'schen Digitalispräparaten kann man das Digitalein und das Digitoxin als ziemlich rein und wirksam bezeichnen, von der charakteristischen Wirkung aber des Digitalins Merck konnte ich mich ebenso wenig überzeugen als Prof. Kobert dies für das Digitalin von Gehe konnte. Es muss somit das betrübende Geständniss gemacht werden, dass ein reines Digitalin (im Sinne Schmiedeberg's) im deutschen Handel nicht existirt. Es existirt aber auch nicht im französischen Handel, denn, was man in Frankreich als reines Digitalin bezeichnet, ist nicht die von Schmiedeberg gemeinte Substanz, sondern theils Digitoxin, theils ein Gemisch von Substanzen. Das Kiliani'sche Digitalin ist noch nicht käuflich.

9) Die Digitalisdrogue ruft am Frosche sämmtliche für die reinen wirksamen Digitalisbestandtheile charakteristischen Digitaliswirkungen hervor und zeigt im Vergleich mit den reinen Digitalisbestandtheilen nur einen quantitativen Unterschied.

10) Die Digitalisdrogue lässt sich Jahre und Jahrzehnte unbeschadet aufbewahren.

11) Sämmtliche von mir untersuchten Drogen wirken am Frosche qualitativ genau so wie Digitalis purpurea und unterscheiden sich von letzterer nur quantitativ, indem sie, je nach

der Droge, bald grössere, bald kleinere Intensität der Wirkung zeigen. *Digitalis ferruginea* L. wirkt circa 10 Mal stärker als *Digitalis purpurea*.

(12) Fast alle Pflanzentheile der *Digitalis* enthalten wirksame Stoffe, aber in verschiedener Quantität. Am meisten enthalten wohl die Samen, dann folgen die Blätter, Samenkapseln und zuletzt die Stengel, die nur sehr wenig resp. gar nicht von den wirksamen Bestandtheilen enthalten. Um den Unterschied in der Wirkung der einzelnen Digitalisarten sowie der einzelnen Pflanzentheile untereinander einerseits und des Digitalins Merck andererseits zu veranschaulichen lege ich am Schlusse meiner Arbeit eine tabellarische Zusammenstellung der betreffenden Versuche bei. Siehe Tab. II.

(13) Der Fingerhut gedeiht auf flachem Lande und künstlich im Garten gezogen nicht schlechter als auf Gebirgen wild gewachsen.

Was die practische Verwerthung der gewonnenen Resultate anlangt, so ist in erster Linie die mit Unrecht von Schmiedeberg bezweifelte Wirkung der *Digitalis* auf die Gefässe hervorzuheben, welche in Verein mit der Herzwirkung und der leichten resp. schweren Resorbirbarkeit der wirksamen Bestandtheile die *Digitalis* bei hydropischen Erscheinungen in Folge von Klappenfehlern des Herzens geradezu zum idealsten Diureticum macht. Denn 1) steigt durch *Digitalis* der arterielle Blutdruck bedeutend in Folge ausgiebigerer Herzthätigkeit und Contraction der Gefässe des ganzen Körpers; 2) kommt es bei contrahirten Gefässen des ganzen Körpers zu einer primären Erweiterung der Nierengefässe durch Digitoxin und besonders durch Digitalein, wie Kobert und Thomson nachgewiesen haben und ich diese Thatsache auf Grund meiner Versuche bestätigen kann. Das sind aber die idealsten Bedingungen einer guten Diurese. Dazu kommt noch 3), dass die Wirkung durch das in H_2O leicht lösliche und daher auch leicht resorbirbare Digitalein rasch eintritt und durch das schwer lösliche Digitalin und Digitoxin zu einer

ehaltigen wird, denn letztere zwei Stoffe werden langsam resorbirt und wirken daher nachhaltig. Eine glücklichere Combination von Stoffen in einer Drogue, wie dies mit der Digitalis der Fall, kann man sich gar nicht denken. Das in H_2O leicht lösliche Digitalein wird freilich eben in Folge seiner leichten Löslichkeit auch rasch vom Organismus ausgeschieden und wäre es auch mit der Wirkung vorbei, aber da kommen die anderen Digitalisbestandtheile, Digitalin und Digitoxin in Betracht. In den in der Praxis gewöhnlich verordneten Infusen des Fingerhutes sind Digitalin und Digitoxin gewiss stets enthalten, denn das in H_2O lösliche Digitonin und theils auch das Digitalein bringen mit sich, wie wir nachgewiesen haben, dass sich Digitalin und Digitoxin in den Infus mit übergehen.

Von dem geschilderten Standpuncte aus die Frage über die therapeutische Bedeutung der reinen wirksamen Digitalisbestandtheile betrachtend, kann man dieselben nicht gerade befürworten, wenn man müsste sie erst entsprechend zusammenmischen um die schon von der Natur selbst in der Drogue uns gebotene glückliche Combination zu erhalten.

Hätte es nicht Sinn die officinelle Digitalis purpurea durch eine der untersuchten Digitalisarten zu ersetzen? Um diese Frage zu beantworten müssen wir uns vergegenwärtigen, was wir eigentlich in den verschiedenen von uns untersuchten Digitalisarten gefunden, das sie von der Digitalis purpurea unterscheiden. Indem wir von den übrigen in dieser Hinsicht kaum in Betracht zu ziehenden Arten absehen, wollen wir hier nur die Digitalis ferruginea hervorheben, die etwa 10 Mal stärker als Digitalis purpurea wirkt. Wir wissen, dass die störenden Nebenwirkungen der Digitalis zum Theil auf Zersetzungsproducten der wirksamen Bestandtheile beruhen, die theils in der Drogue präformirt vorkommen, theils erst durch Zersetzung entstehen können. Paschkis z. B. stellte aus der Digitalis ambigua Murr. Digitalein dar, welches sich durch besonders geringe Toxicität

auszeichnen soll, welche Eigenschaft aber Paschkis nur auf grössere Reinheit bezieht. Unter solchen Umständen wäre es doch recht wünschenswerth bei Verabreichung von Digitalis von den Zersetzungsproducten nur so wenig wie möglich mit zu verabreichen. Wenn nun Digitalis ferruginea vielfach stärker wirkt als Digitalis purpurea, so könnte man doch in den bezüglichen Fällen von der ersteren entsprechend kleinere Dosen anwenden und dadurch event. die störenden Mitwirkungen, namentlich auf den Darm, bedeutend herabsetzen. Freilich können in der Digitalis ferruginea auch die Zersetzungsproducte in entsprechend grösserer Quantität vertreten sein, nothwendig ist das aber nicht, zumal die Digitalis ferruginea in Italien statt der Digitalis purpurea mit Erfolg gebräuchlich ist. Pharmako-therapeutische Versuche könnten den Sachverhalt aufklären. Zur Darstellung aber der reinen wirksamen Digitalisbestandtheile wird Digitalis ferruginea ganz ohne Frage statt Digitalis purpurea zu empfehlen sein.

Ein weiterer practischer Wink auf Grund meiner Untersuchungen wäre der, dass bei der Anwendung der Digitalispflanze nicht nur die Stengel, sondern womöglich auch die Blattstiele und Mittelnerven zu vermeiden sind, denn letztere zwei sind ebenfalls nichts anderes als Stengel — nur kleineren Umpfanges. Stengel aber der Digitalis wirken entweder gar nicht digitalisartig oder gar schädlich — krampferregend etc. Nach Tourdes hat Oulmont bei Prüfung verschiedener aus dem Handel stammender Sorten herbae Digitalis grosse Differenzen in Bezug auf die Wirksamkeit der einzelnen bemerkt und will dieses nicht auf Boden und klimatische Verhältnisse, sondern auf die Sammlung und Zubereitung bezogen wissen, indem man für gute Sorten (z. B. in Strassburg) nur tadellose Blätter von zweijährigen Pflanzen kurz vor dem Blühen sammelt, nicht allein den Stengel, sondern auch die Mittelnerven der Blätter vollständig ver-

1) Tourdes, G., Notes sur les differences d'action des preparations de digitale. Gaz. méd. de Strassburg. Nr. 15. p. 191. 1874 (1875?)

rt. 1 g der gepulverten Blätter sollen 5 mg Digitalin enthalten. Auch Durosiez ¹⁾ legt ein besonderes Gewicht auf die Güte der Droge, die wohl von den eben erwähnten Bedingungen abhängig sein wird. Er hat am Krankenbette ermittelt, dass gutes Pulver von Fingerhutblättern weit kräftiger ist, als gewöhnlich annimmt, so dass 0,02 g an Wirkungsintensität nem *granale* (0,001) Digitalin von Homolle gleichkommen. Also auch Durosiez hat, wie ich oben an der *D. ferruginea*, nur einen 20-fachen Unterschied an Wirkungsintensität zwischen Droge und Droguenbestandtheil gefunden.

Wir haben eben von Tourdes erfahren, dass Boden und klimatische Verhältnisse auf die Güte der Digitalis nicht von Einfluss sind. Ich kann diese Thatsache, als weitere Folge meiner Untersuchungen, nur bestätigen. Auf Gebirgen und wild gewachsene Digitalis gilt als die beste Sorte. Ich habe nun auf achem Lande und in einem Garten künstlich gezogene Digitalis untersucht und habe keinen Unterschied ermitteln können. Es wird sich also empfehlen Digitalis einfach in Gärten zu ziehen und nicht auf hohe Berge zu steigen um die wildwachsende Pflanze aufzusuchen und dann den armen Mann für diese unnöthige Mühe bezahlen zu lassen.

Ferner kann ich denjenigen, die der Meinung sind, dass Digitalisblätter nach relativ kurzer Zeit unwirksam werden, versichern, dass das nicht der Fall ist. Die Blätter können Jahrzehnte lang unbeschadet aufgehoben werden: ich habe pulverisirte Blätter von *D. pp.* untersucht, die seit Buchheim im Dorpater pharmakol. Institut aufgehoben werden, etwa 35 Jahre lang, und fand dieselben von ausgezeichneter Wirkung. Auch Perron ²⁾ fand 16 Jahre alte Digitalis wirksam. Ob die Blätter im ersten oder zweiten Jahre der Pflanze eingesammelt werden, ist ziemlich gleichgültig.

1) Durosiez, P., de la digitale. Mémoire lu à la Soc. de méd. Union méd. Nr. 92. p. 49.

2) Perron, Journ. de pharmacie et de chimie 1892. p. 939.

Tabelle II.

Nummer des Versuches.	Dosis in Mgm.	Digitalis species.		Eintritt der Wirkung nach Stunden.		Intoxica- tions- dauer in Stunden.	Erfolg.	Herz in
				Stun- den.	Minuten.			
25	200	1. Folia Digitalis purpureae L.	.	—	10	6	Tod	Systole
26	60	»	»	2	33	48	»	»
30	400	»	nervosae Steud.	4	4	20	»	»
33	300	»	»	—	43	17	»	»
40	150	»	giganteae Fisch.	1	25	31	»	»
46	100	»	ferrugineae L.	—	9	7	»	»
47	50	»	»	—	23	23	»	»
48	25	»	»	—	8	1 1/2	»	»
49	10	»	»	—	25	16	Erholung	—
53	50	»	eriostachys	—	10 (?)	4	Tod	Diastole
54	100	»	»	—	16	48	A bbruch	
55	50	»	Fontanesii Steud.	—	12 (?)	45	Tod	Systole (?)
56	200	»	»	?	(?)	19	Erholung	—
56	100	»	»	—	13	19	Tod	?
57	150	»	glandulosae	1	30	30	»	Mittelstellung
27	40	1. Sem. Digitalis purpureae L.	.	—	29	44	Erholung	—
28	40	»	»	—	20	23	Tod	Systole
34	200	»	nervosae Steud.	—	13	4	»	»
35	100	»	»	—	22 (?)	1 1/2	»	
36	50	»	»	—	23	21	»	Mittelstellung

Nummer des Versuches.	Dosis in Mmg.	Digitalis species.	Eintritt der Wirkung nach Stunden.	Minuten.	Intoxica- tions- dauer in Stunden.	Erfolg.	Herz in
42	50	3. Sem. Digitalis giganteae Fisch.	—	7	17	Tod	Systole
43	20	» » » » »	—	34	6	Erholung	—
52	20	» » ferrugineae L.	1	5	24	»	—
58	50	» » glandulosae	1	20	14	»	—
59	30	» » » » »	—	—	—	—	—
59	100	» » » » »	—	37	24	Tod	Systole
37	200	2. Capsulae sem. Digital. nervosae Steud.	—	15	7	Tod	Spitzensystole
44	50	» » » giganteae Fisch.	—	25	7	Erholung	—
60	200	» » » glandulosae	—	33	23	Tod	Systole
38	100	Stipites Digitalis nervosae Steud.	1	27	48	Tod	Systole
39	1000	» » » » »	—	5 (Krämpfe)	19 1/2	»	Spitzensystole
45	2000	» » » giganteae Fisch.	—	—	—	—	—
45	2000	» » » » »	—	—	18	Tod	Diastole
61	3000	» » » glandulosae	1	—	19	»	»
1	2	Digitalein Merck	—	31	8	Abbruch	Systole
2	4	» » » » »	—	30	22	Tod	»
3	1	» » » » »	—	47	22	»	»
4	10	» » » » »	—	5	1 1/4	»	»
5	0.5	» » » » »	—	—	—	—	—
6	1	» » » » »	—	40	24	Tod	Systole

Thesen.

1. Digitalis purpurea L. wäre wenigstens zur Darstellung der reinen wirksamen Digitalisbestandtheile durch Digitalis ferruginea L. zu ersetzen.
2. Pillen aus Digitalisblättern sind zur Zeit anderen Digitalispräparaten vorzuziehen.
3. Zur medicamentösen Behandlung chronischer hartnäckiger Obstipation eignet sich gut abgelagerte Cortex Rhamni Frangulae am vorzüglichsten.
4. Haemol und Haemogallol (Kobert) sind voraussichtlich die besten Eisenpräparate.
5. Der Effect der Kochsalzinfusion bei Gefahr des acuten Verblutungstodes soll stets durch Warmwasserinjection ins Rectum unterstützt werden.
6. Bei chronischer allgemeiner Furunkulose soll die Untersuchung des Harns auf Zucker nicht versäumt werden.
7. Schulärzte sollten angehalten werden in bestimmten Zeitperioden die Schüler zu untersuchen und die Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen.

Im Juni 1892.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Historisches	7
I. Chemischer Theil	13
II. Physiologischer Theil	23
1. Wirkungen an Kaltblütern	23
2. Wirkungen an Warmblütern	31
Eigene Untersuchungen.	38
I. Mit reinen Digitalisbestandtheilen	38
A. Physiologische Versuche	39
1. Digitalein	39
1. Versuche an Kaltblütern	39
a) Ueber die Wirkung auf das durch einen Fenster-	
schnitt freigelegte Froschherz	39
b) Ueber die Wirkung auf das isolirte und am Wil-	
liams'schen Apparate befestigte Herz	46
c) Ueber die Wirkung auf die isolirte Muskulatur	49
2. Versuche an Warmblütern	56
2. Digitalin	60
3. Digitoxin	61
B. Versuche über die Lösbarkeit des Digitalins und Digitoxins	62
II. Versuche mit Digitalisspecies	67
1. Digitalis purpurea L.	69
2. Digitalis nervosa Steud. et Hochst.	72
3. Digitalis gigantea Fisch.	87
4. Digitalis ferruginea L.	92
5. Digitalis eriostachys	103
6. Digitalis Fontanesii Steud.	105
7. Digitalis glandulosa	107
III. Zusammenfassung der Ergebnisse.	112
Thesen	120

